





御纂醫宗金鑑卷四

訂正仲景全書傷寒論註陽明全篇目錄

白虎加入參湯

白虎湯

小承氣湯

麻仁丸

調胃承氣湯

大承氣湯

蜜煎導方

豬膽汁導方

土瓜根導方

豬苓湯

麻黃連軀赤小豆湯

茵陳蒿湯

梔子蘘皮湯

小承氣湯

白朮湯

白朮散人參湯

以上五方皆全書外家論中全錄目錄

醫宗金鑑卷四

御纂醫宗金鑑卷四

訂正仲景全書傷寒論註

辨陽明病脈證并治全篇

陽明主裏內候胃中外候肌肉故有病經病府之分如論
中身熱煩渴目痛鼻乾不得眠不惡寒反惡熱者此陽明
經病也潮熱譫語手足腋下濺然汗出腹滿痛大便鞭者
此陽明府病也而其候各有三經病則有邪已傳陽明而
太陽之表未罷兼見頭痛惡寒無汗之太陽證者有太陽
之邪已罷悉傳陽明但見壯熱有汗心煩不眠口渴引飲
之陽明證者有陽明之邪未已復轉少陽兼見胸脇痛寒

熱往來口苦而嘔目眩耳聾之少陽證者府病則有太陽
陽明謂太陽病或發汗或吐或下或利小便亡其津液胃
中乾燥太陽之邪乘胃燥而轉屬陽明致小便反數大便
鞭者所爲脾約是也有正陽陽明謂陽氣素盛或有宿食
太陽之邪一傳陽明遂入胃府致大便不通者所爲胃家
實是也有少陽陽明謂病已到少陽法當和解而反發汗
利小便亡其津液胃中燥熱復轉屬陽明致大便結燥者
所爲大便難者是也其治陽明經病則以葛根湯或桂枝
加葛根湯發之或以白虎湯清之或以柴胡白虎湯和之
隨其證而施之可也其治陽明府病雖均爲可下然不無

輕重之分故或以三承氣湯下之或麻仁丸通之或蜜煎
膽汁導之量其病而治之可也此陽明病之大略也茲以
在經在府二者詳疏於篇俾讀者易爲分別則臨證施治
自不紊矣

陽明之爲病胃家實是也

註

陽明經內以候胃外以候肌言陽明之爲病由太陽之邪
傳於其經則爲陽明病外證由太陽之邪傳入胃府則爲
胃家實也

集註

方有執曰陽明經也胃府也實者大便結爲鞭滿而不得
出也雖則遲早不同而非日數所可拘也

傷寒三日陽明脈大

註傷寒一日太陽二日陽明三日少陽乃內經言傳經之次第非必以日數拘也此云三日陽明脈大者謂不兼太陽陽明之浮大亦不兼少陽陽明之弦大而正見正陽陽明之大脈也蓋由去表傳裏邪熱入胃而成內實之診故其脈象有如此者

集方有執曰傷寒三日該中風而大約言也脈大者陽明氣血俱多也

沈明宗曰此正陽明之正脈也仲景謂三日陽明脈大因陽明乃多氣多血之府風寒傳入邪盛於中故脈顯大是

爲陽明邪實之正脈但病陽明務具此脈方可下奪或兼
太陽之浮緊少陽之弦細或遲疾滑澀虛弱乃屬氣血陰
陽之虛雖見大實大滿亦當詳審顧慮或以小承氣湯試
之或用蜜煎導法不得直施攻下也

本太陽初得病時發其汗汗先出不微因轉屬陽明也

註

陽明之病本自太陽初得病時發其汗汗先出而不透微
乃爲汗不如法故未盡之邪因而轉屬陽明也邪在經則
爲外證邪入府則爲胃家實也

集註

方有執曰此言由發太陽汗不如法致病入胃之大意
陽明病若能食名中風不能食名中寒

註

太陽之邪傳陽明病有自中風傳來者有自傷寒傳來者當於食之能否辨之若能食名中風是自中風傳來者以風乃陽邪陽能化穀故能食也不能食名中寒是自傷寒傳來者以寒乃陰邪不能化穀故不能食也

集註

方有執曰此以食之能否驗風寒之辨蓋陽明主水穀風能食陽能化穀也寒不能食陰不化穀也名猶言爲也中寒卽傷寒之互詞大意推原風寒自太陽傳來其辨驗有如此者非謂陽明白中而然也

汪琥曰仲景云中寒與傷寒同義非真寒證也若係真中寒是胃家虛冷藥宜理中湯之類今不能食是胃氣實但

邪未入府不作鬱熱耳因名中寒實與傷寒無異

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

註

陽明病有外證有內證潮熱自汗不大便內證也身熱汗自出不惡寒反惡熱外證也今汗自出是從中風傳來故與中風之外證同而身熱不惡寒反惡熱則知為陽明外證故不與中風外證同也然陽明之熱發於肌肉必蒸蒸而熱又不似太陽之陣陣發熱可知矣

集註

方有執曰此以太陽中風傳入陽明之外證言

魏荔彤曰病有太陽中風不解傳入陽明者何以辨之故設問曰陽明未知其裏之何時傳來必先驗其外之何所

見證答曰太陽病有身熱汗自出而惡風者此太陽中風之本證也若身熱汗自出竟不惡風寒而反惡熱則病已去太陽而入陽明矣此陽明病由太陽中風而傳入者也問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷卽自汗出而惡熱也

註

太陽病當惡寒陽明病當惡熱今陽明病有初得之一日不發熱而惡寒者是太陽去表之邪未盡故仍惡寒也然去表未盡之邪欲傳陽明不能久持故惡寒必將自罷卽日當自汗出而惡熱矣

集註

方有執曰此以太陽傷寒傳入陽明之外證言

程應旌曰陽明惡寒終是帶表至於府病則惡熱矣表之
罷否須於此驗之

鄭重光曰此辨陽明傷寒之外證不發熱而惡寒起自傷
寒也惡寒將自罷邪過表也卽自汗出邪熱鬱於肌肉腠
理開汗外洩也

魏荔彤曰太陽傷寒亦有傳入陽明者又何以辨之故設
問曰病有得之一日起初之時不見發熱而但見惡寒者
何病也答曰得之一日惡寒雖爲太陽傷寒之證而惡寒
亦將自罷卽自汗出而發熱此是陽明病由太陽傷寒而
傳入者也可知太陽中風則發熱惡風汗自出爲正病太

陽傷寒則惡寒無汗為正病若傳入陽明則必以汗出惡熱為正病也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中主土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日即止此為陽明病也

註此釋上條陽明惡寒自罷之義陽明屬胃居中土也土為

萬物所歸故邪熱歸胃則無所復傳亦萬物歸土之義陽明初病一日雖仍惡寒是太陽之表未罷也至二日惡寒自止則是太陽之邪已悉歸併陽明此為陽明病也

集註

方有執曰惡寒二日自止者熱入裏而將惡熱此以正陽

陽明言也

程應旆曰六經雖分陰陽而宰之者胃五藏六府皆朝宗而稟令焉一有燥熱無論三陽傳來之邪從而化熱卽三陰傳來之邪亦轉屬而變熱陰陽之邪皆歸胃土故曰萬物所歸無所復傳也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也

註問曰何緣得陽明胃實之病答曰由邪在太陽時發汗若下若利小便皆爲去邪而設治之誠當則邪解而愈矣如其不當徒亡津液致令胃中乾燥則未盡之表邪乘其燥

熱因而轉屬陽明爲胃實之病者有三曰不更衣卽太陽
陽明脾約是也曰內實卽正陽陽明胃家實是也曰大便
難卽少陽陽明大便難是也三者雖均爲可下之證然不
無輕重之別脾約自輕於大便難大便難自輕於胃家實
蓋病脾約大便難者每因其人津液素虧或因汗下利小
便施治失宜所致若胃實者則其人陽氣素盛胃有宿食
卽未經汗下而亦入胃成實也故已經汗下者爲奪血致
燥之陽明以滋燥爲主未經汗下者爲熱盛致燥之陽明
以攻熱爲急此三承氣湯脾約丸及蜜煎土瓜根豬膽汁
導法之所由分也

集註方有執曰古人大便必更衣不更衣言不大便也

程應旄曰轉屬層次不止有表罷不罷之分而表罷入裏復有燥實燥不實之辨所以有不更衣之陽明病有內實之陽明病有大便難之陽明病也其中有屬表屬裏所以有下法有禁有宜受氣有裏實裏燥所以下法有應大應小汪琥曰或問太陽病若下矣則胃中之物已去縱亡津液胃中乾燥未必復成內實答云方其太陽初病時下之不當徒亡津液胃中之物去之不盡邪傳陽明而成燥糞故有內實之證

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太

陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也

註陽明可下之證不止於胃家實也其綱有三故又設問答

以明之也太陽之邪乘胃燥熱傳入陽明謂之太陽陽明不更衣無所苦名脾約者是也太陽之邪乘胃宿食與燥熱結謂之正陽陽明不大便內實滿痛名胃家實者是也太陽之邪已到少陽法當和解而反發汗利小便傷其津液少陽之邪復乘胃燥轉屬陽明謂之少陽陽明大便澀而難出名大便難者是也

集程知曰言三陽皆有入胃府之證也陽明為水穀之海中

土爲萬物所歸故三陽經皆能入其府邪自太陽傳入胃
府者謂之太陽陽明卽經所謂太陽病若吐若下若發汗
後微煩小便數大便因鞭者是也由脾之斂約故用小承
氣微下以和之邪自陽明經傳入胃府者謂之正陽陽明
卽經所謂發熱汗出胃中燥鞭譫語者是也乃胃中邪實
故用大承氣以攻下之邪自少陽轉屬胃府者謂之少陽
陽明卽經所謂少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃者是
也係津液內竭故用麻仁丸潤下以和其津液也若三陽
外證未除則陽明正治之法又不可用矣

陽明病軼浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

按

自汗是陽明證盜汗是少陽證盜汗當是自汗文義始屬

註

陽明病在經脈當浮長入府脈當實大今脈浮而緊潮熱
有時者是陽明病而見太陽傷寒脈也則知是從傷寒傳
來太陽傷寒之邪未罷必無汗故雖見陽明潮熱發作有
時之證仍當從太陽陽明傷寒治之宜麻黃加葛根湯汗
之若見潮熱發作有時之證而脈但浮不緊是陽明病而
見太陽中風脈也則知是從中風傳來太陽中風之邪未
罷必自汗出當從太陽陽明中風治之宜桂枝加葛根湯
解之

集註

沈明宗曰此陽明證而見太陽脈也脈浮而緊太陽表寒

未罷之脈潮熱發作有時則陽明裏證已具但浮者太陽風傷衛脈故必汗出也

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

按

汗出多之下當有發熱二字若無此二字脈遲汗出多微惡寒乃是表陽虛桂枝附子湯證也豈有用桂枝湯發汗之理乎必是傳寫之遺

註

陽明病脈當數大今脈遲汗出多設不發熱惡寒是太陽表邪已解矣今發熱微惡寒是表猶未盡解也故宜桂枝湯解肌以發其汗使初入陽明之表邪仍還表而出也

集註

程知曰此言中風傳陽明表邪未解仍宜用桂枝湯以解

肌也

汪琥曰此太陽病初傳陽明經中有風邪也。脈遲者太陽中風，緩脈之所變傳至陽明邪將入裏故脈變遲。汗出多者陽明熱而肌腠疎也。微惡寒者在表風邪未盡也。故仍從太陽中風例治之。又曰雖從太陽例治但既云陽明病仲景法還宜用桂枝加葛根湯爲是。

陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

註

陽明病脈應浮大證應汗出今脈但浮表病脈也無汗而喘表實證也是太陽之邪未悉入陽明猶在表也當仍從太陽傷寒治之發汗則愈宜麻黃湯。

集註

張璐曰陽明榮衛難辨辨之全藉於脈證風邪之脈傳至

陽明自汗已多則緩去而遲在寒邪之脈傳至陽明發熱已甚則緊去而浮在此皆邪氣在經之徵若入府則遲者必數浮者必實矣設不數不實非胃實也必不勝攻下矣汪琥曰無汗而喘俱浮不緊何以定其爲陽明病必其人目痛鼻乾身熱不得眠故云陽明病也

魏荔彤曰此太陽陽明之證入陽明未深故令其邪仍自表出不至歸於胃而無所復傳也

陽脈微而汗出少者爲自和也汗出多者爲太過陽脈實因發其汗出多者亦爲太過太過者爲陽絕於裏亡津液大便因鞭

也

註

此承上條互詳其脈以出其證也脈陽微謂脈浮無力而微也陽脈實謂脈浮有力而盛也凡中風傷寒脈陽微則熱微微熱蒸表作汗若汗出少者爲自和欲解汗出多者爲太過不解也陽脈實則熱盛因熱盛而發其汗出多者亦爲太過汗出太過則陽極於裏亡津液大便因鞭而成內實之證矣勢不得不用下法故欲發其汗者不可不早慮及此也

集註

喻昌曰陽微者中風之脈陽微緩也陽實者傷寒之脈陽緊實也陽絕卽亡津液之互辭仲景每於亡津液者悉名

無陽玩本文陽絕於裏亡津液大便因鞭甚明傷寒發太
陽膀胱經之汗卽當顧慮陽氣以膀胱主氣化故也發陽
明胃經之汗卽當顧慮陰津以胃中藏津液故也所以陽
明多有熱越之證謂胃中津液隨熱而盡越於外汗出不
止耳然則陽明病不論中風傷寒微脈實汗出少而邪
將自解汗出多則陰津易致竭絕也

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也

註

陽明病法當汗多反無汗其身如蟲行皮中狀者以其人
胃氣久虛邪鬱於太陽之表陽明肌腠不能宣發作汗故
也宜葛根湯小劑微汗和其肌表自可愈也

集註

汪琥曰按此條論仲景無治法常器之云可用桂枝加黃

耆湯郭雍云宜用桂枝麻黃各半湯不知上二湯皆太陽

經藥今係陽明無汗證仍宜用葛根湯主之

魏荔彤曰陽明病法應多汗今反無汗但見身如蟲行皮

中狀者此邪熱欲出表作汗而正氣衰弱不能達之也

陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翁翁如有

熱狀奄然發狂濺然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共併

緊則愈

註

陽明病初欲食知其從中風熱邪傳來也陽明受邪當小

便數大便鞭今小便反不利大便自調知津未傷而胃自

和不成裏實也既不成實則在經之邪本輕可自愈也若
其人骨節疼翁翁如有熱狀是太陽之表未除也奄忽也
忽然發狂濺然汗出而解者蓋以太陽傳來之邪本輕陽
明所受之邪自淺津未傷而胃自和仍當還表作解也然
必待發狂而解者此胃中水氣不勝初欲食之穀氣穀氣
長陽化熱水不勝熱釀汗共併而出所以發狂作解也凡
將汗解衾必先浮今言衾緊則愈者亦邪還於表欲解應
見之衾也

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濺濺然者是轉屬陽明也

註傷寒發熱無汗嘔不能食爲太陽之邪欲傳也若無汗爲

太陽陽明之表尚在汗之可也今反汗出濇濇然者是邪已轉屬陽明之府可下不可汗也

集註

成無已曰傷寒發熱無汗嘔不能食者太陽受病也若反汗出濇濇然者是太陽之邪轉屬陽明也故經曰陽明病法多汗

方有執曰嘔不能食熱入胃也反汗出者肌肉著熱膚腠反開也

程應旂曰太陽本證現在而反汗出濇濇然者雖表證未罷已是轉屬陽明也濇濇連綿之意卽俗云汗一身不了又一身是也

傷寒蠱浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加入參湯主之

註

傷寒之邪傳入陽明蠱浮發熱無汗其表不解者雖有燥渴乃大青龍湯證不可與白虎湯卽有陽明渴欲飲水熱證應與白虎者亦必審其無太陽表證始可與也加入參者以其蠱浮不滑非有餘也且欲於大解熱中速生其津液也

集註

鄭重光曰此申明用白虎湯之法以白虎但能解熱而不解表若稍帶外感有無汗惡寒身痛頭疼之表證慎不可用也

白虎加人參湯方

於白虎湯方內加入參三兩餘依白虎湯方

傷寒脈浮滑此以表有熱裏有寒白虎湯主之

按

王三陽云經文寒字當邪字解亦熱也其說甚是若是寒字非白虎湯證矣

註

此言傷寒太陽證罷邪傳陽明表裏俱熱而未成胃實之

病也脈浮滑者浮爲表有熱之脈陽明表有熱當發熱汗

出滑爲裏有熱之脈陽明裏有熱當煩渴引飲故曰裏有

熱裏有熱也此爲陽明表裏俱熱之證白虎乃解陽明表

裏俱熱之藥故主之也不加人參者以其未經汗下不

虛故也

集註

程知曰滑則裏熱云浮滑則表裏俱熱矣大熱之氣得辛

涼而解猶之暑暍之令得金風而爽故清涼之劑以白虎
名之又曰厥陰條中有傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎
湯主之可證此條之非裏有寒矣

魏荔彤曰此裏尚爲經絡之裏非藏府之裏亦如衛爲表
榮爲裏非指藏府而言也

白虎湯方

知母

六兩

石膏

碎一觔

甘草

二兩炙

粳米

六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

集解

柯琴曰陽明邪從熱化故不惡寒而惡熱熱蒸外越故熱

汗出熱爍胃中故渴欲飲水邪盛而實故脈滑然猶在經
故兼浮也蓋陽明屬胃外主肌肉雖內外大熱而未實終
非苦寒之味所宜也石膏辛寒辛能解肌熱寒能勝胃火
寒能沉內辛能走外此味兩擅內外之能故以爲君知母
苦潤苦以瀉火潤以滋燥故用爲臣甘草粳米調和於中
宮且能土中瀉火稼穡作甘寒劑得之緩其寒苦劑得之
平其苦使二味爲佐庶大寒大苦之品無傷損脾胃之慮
也煮湯入胃輸脾歸肺水精四布大煩大渴可除矣白虎
爲西方金神取以名湯秋金得令而炎暑自解方中有

加人參者亦補中益氣而生津也用以協和甘草粳米之
補承制石膏知母之寒瀉火而土不傷乃操萬全之術者
也

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實
者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯

註

病人謂病太陽經中風傷寒之人也太陽病煩熱汗出則
應解矣今又寒熱如瘧狀每至日晡所即發潮熱日晡者
乃申酉陽明王時故曰屬陽明也證雖如此當審其果盡
歸陽明耶抑或尚兼太陽也故又當以脈辨之若脈實者
邪已入裏則汗出潮熱爲陽明下證宜與大承氣湯下之

若脈浮虛者邪尚在表則寒熱如瘧仍屬太陽當汗之證也宜與桂枝湯汗之

集註

程知曰病人得汗後煩熱解太陽之邪將盡未盡其人復如瘧狀日晡時發熱則邪入陽明審矣然雖已入陽明尚恐未離太陽故必重辨其脈脈實者可下若脈浮虛者仍是陽明兼太陽便宜汗而不宜下也

太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈

註

太陽病若吐若下若發汗後不解入裏微煩者乃梔子豉湯證也今小便數大便因鞭是津液下等也當與小承氣

湯和之以其結熱未甚入裏未深也

集註

喻昌曰微煩小便數大便因鞭皆是邪漸入裏之機故用

小承氣湯和之

程應旆曰吐下汗後而見煩證微之於大便鞭固非虛煩者比然煩既微而小便數當由胃家失潤燥氣客之使然胃雖實非大實也以小承氣湯取其和也非大攻也

小承氣湯方

大黃

四兩

厚朴

二兩去皮炙

枳實

三枚大者炙

已上三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則鞭其脾爲約麻仁丸主之

註

跌陽胃經脈也跌陽脈浮而濇陽浮則胃氣強陰濇則小便數陰陽相搏則熱盛而液竭矣故大便則鞭也其名爲約者謂脾爲邪所約束不能爲胃行其津液故名脾約也以麻仁丸主之養液潤燥清熱通幽其不敢恣行承氣者以脈濇故也

集註

程知曰言胃脈浮濇不可大攻宜用麻仁丸潤法也跌陽胃脈也在足跗上動脈應手浮則陽熱盛而胃強濇則陰津少而小便數脾主爲胃行其津液者也胃陽強則脾金

弱不能爲胃行其津液故約其食物如一二彈丸也此不當下而當潤之

程應旄曰麻仁丸潤燥通幽傷寒不可恣行大承氣可知矣所以然者以其爲太陽陽明非正陽陽明胃家實者比也推之少陽陽明其不可以正陽陽明胃家實之法治之更可知矣

汪琥曰以胃強脾弱爲脾約作解蓋以胃中之邪熱盛爲陽強故脈浮脾家之津液少爲陰弱故脈濇用麻仁丸者以瀉胃中之陽而扶脾之陰也

麻仁丸方

麻仁 二升

芍藥 半觔

枳實 半觔

大黃 一觔 去皮

厚朴 一觔 去皮

杏仁 一升 去皮尖 熬別作脂

右六味蜜合丸如桐子大飲服十九日三服漸加以和為

度

集解

方有執曰麻子杏仁能潤乾燥之堅枳實厚朴能導固結

之滯芍藥斂液以輔潤大黃推陳以致新脾雖為約此能

疏之

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

註

傷寒吐後胸不脹滿而腹脹滿者是表邪已盡胃中壅熱

故也宜與調胃承氣湯下其熱而和之以無鞭痛故不用

大小承氣也

集註

程知曰言吐後腹脹滿宜調胃也熱在上焦則吐吐後腹

脹滿則邪不在胸其為裏實可知然脹滿而不鞭痛自不宜用急下之法但與調胃承氣和其胃熱可耳內經云諸

脹腹大皆屬於熱也
程應旄曰吐傷津液燥氣不能下達遂成土鬱是以腹脹
滿用調胃承氣一奪其鬱可耳

調胃承氣湯方

大黃

四兩去皮酒浸

甘草

二兩炙

芒消

半升

右三味以水三升煮取一升去滓內芒消更煮兩沸少少

溫服之

方解

方名調胃承氣者有調和承順胃氣之義非若大小承氣專攻下也經曰熱淫於內治以鹹寒火淫於內治以苦寒君大黃之苦寒臣芒消之鹹寒二味並舉攻熱瀉火之力備矣恐其速下故佐甘草之緩又恐其過下故少少溫服之其意在不峻而和也

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

註

陽明病謂已傳陽明不吐不下心煩者謂未經吐下而心煩也其爲熱盛實煩可知故與調胃承氣湯瀉熱而煩自除也

集註

成無已曰吐後心煩謂之內煩下後心煩謂之虛煩今陽

明病不吐不下心煩則是胃有鬱熱也與調胃承氣湯以
下其鬱熱

喻昌曰胃氣及津液既不由吐下而傷則心煩明係胃中
熱熾故可與調胃承氣湯

陽明發熱汗多者急下之宜大承氣湯

註

陽明病不大便發熱汗多不止者雖無內實亦當急下之
蓋因陽氣大蒸於內恐致陰液暴亡於外故以全津液爲
急務也宜大承氣湯下之

集註

喻昌曰汗多則津液外滲加以發熱則津液盡隨熱勢蒸

蒸騰達於外更無他法以止其汗惟有急下一法引熱勢從大腸而出庶津液不致盡越於外耳

程應旌曰此等之下皆為救陰而設不在奪實奪實之下可緩救陰之下不可緩

沈明宗曰陽明裏實以潮熱微汗為正茲見發熱汗多乃裏熱熾盛之極蒸騰胃中津液盡越於外非亟奪其邪以救津液不可故宜大承氣湯急下也

大承氣湯方

大黃四兩 酒洗 厚朴半斤 炙 枳實五枚 炙 芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃更煮取

二升去滓內芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下後勿服

方解

諸積熱結於裏而成滿痞燥實者均以大承氣湯下之也
滿者腹脇滿急腹脹故用厚朴以消氣壅痞者心下痞塞
硬堅故用枳實以破氣結燥者腸中燥屎乾結故用芒硝
潤燥軟堅實者腹痛大便不通故用大黃攻積瀉熱然必
審四證之輕重四藥之多少適其宜始可與也若邪重劑
輕則邪氣不服邪輕劑重則正氣轉傷不可不慎也

集解

柯琴曰諸病皆因於氣穢物之不去由於氣之不順也故
攻積之劑必用氣分之藥因以承氣名湯方分大小有二

義焉厚朴倍大黃是氣藥爲君名大承氣大黃倍厚朴是
氣藥爲臣名小承氣味多性猛制大其服欲令大瀉下也
因名曰大味寡性緩制小其服欲微和胃氣也因名曰小
且煎法更有妙義大承氣用水一斗煮朴枳取五升去滓
內大黃再煮取二升內芒消何哉蓋生者氣銳而先行熟
者氣純而和緩仲景欲使芒消先化燥屎大黃繼通地道
而後枳朴除其痞滿若小承氣以三味同煎不分次第同
一大黃而煎法不同此可見仲景微和之意也

程知曰調胃承氣大黃用酒浸大承氣大黃用酒洗皆爲
芒消之鹹寒而以酒制之若小承氣不用芒消則亦不事

酒浸洗矣

陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭
鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯

註

陽明病下之後心中懊懣而煩者若腹大滿不大便小便
數知胃中未盡之燥屎復鞭也乃可攻之若腹微滿不可
攻也誤攻必變脹滿不能食飲水則噦等逆矣若果有燥
屎宜下者以大承氣湯下之

集註

方有執曰可攻以上以轉失氣言懊懣懣懣痛恨之意蓋
藥力不足以勝病燥鞭欲行而不能故曰可攻言當更服
湯以促之也腹微滿以下以不轉失氣言頭鞭後澹裏熱

輕也故曰不可攻之言當止湯勿服也

程知曰言有燥屎即可大攻下也下後心中懊憹而煩者
虛煩也當與梔子豉湯若胃有燥屎則非虛煩故可攻腹
不甚滿則無必攻之法有燥屎則非先鞭後溏者也故可
攻又曰便鞭與燥屎不同便鞭者大便實滿而鞭燥屎者
胃中宿食因胃熱而結爲燥丸之屎也故便鞭猶有用小
承氣者若燥屎則無不用芒消之鹹寒也

程應旂曰末句乃申可攻句以決治法

得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能
食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升

若不_二大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必澹須小便利屎定鞭乃可攻之宜大承氣湯

註

得病二三日無太陽少陽證煩躁心下鞭至四五日不大便若脈大屬正陽陽明胃實之證也下之無疑今脈弱雖胃和能食不可輕下祇可與小承氣湯少少與而微和之令其小安次日仍不大便繼與小承氣湯促之若六七日竟不大便而小便少者卽不能食亦屬胃中尚未乾燥屎未定鞭如大攻之初見鞭復必澹也須待小便利知屎定鞭乃可攻之宜大承氣湯

集註

方有執曰太陽不言藥以有桂枝麻黃之不同也少陽言

藥以專主柴胡也凡以此爲文者皆互發也以無太少二經證故知此屬陽明以脈弱故宜微和至六日以下乃歷叙可攻不可攻之節度也

程應旌曰能食以結在腸間而胃火自盛也先以小承氣湯少少與之和胃中之火令少安後以前藥增至一升去腸中之結旣用小承氣矣而又減去分數接續投之以鹹弱之胃其稟素虛而爲日又未久也

張璐曰此段之能食不能食全與辨風寒強弱無涉言能食者不可以爲胃強而輕下不能食者不可以爲胃中有燥屎而輕下也

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便已鞅也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

註

陽明病脈遲雖汗出不惡寒外證欲解而脈不實尚未可攻也若其人身重熱困於體也短氣而喘熱壅於上也腹滿潮熱熱聚於中也手足濇然汗出大便已鞅熱結於下也斯爲外邪已解內實已成始可攻之主以大承氣湯可也若汗出微發熱惡寒者則外猶未解也其熱不潮者裏

猶未實也不可與承氣湯卽有裏急腹大滿不通等證亦祇宜與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下蓋以脈遲故也

集註

方有執曰潮熱陽明王於申酉戌故熱作於此時如潮之

有信也手足濇然而汗出者脾主四肢而胃爲之合胃中

燥實而蒸蒸騰達於四肢故曰大便已鞭也

林潤曰此節辨脈遲內結之或宜大承氣攻之或但可以

小承氣微和之也陽明病脈遲證兼汗出不惡寒身重短

氣腹滿而喘似屬可攻然必有潮熱者爲外證已解裏證

已具手足濇然汗出者爲大便已鞭主以大承氣湯攻之

吳疑若汗出雖多猶見發熱惡寒則表尙在也其熱不潮

汗亦非手足濇然之汗安可與承氣以攻之乎卽瀉大滿不通亦祇可與小承氣微和勿令大泄下此何以故脈遲便非必下之脈雖內結亦豈大承氣所宜哉

陽明病潮熱大便微硬者可與大承氣湯不硬者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭硬後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復硬而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

註陽明病潮熱大便微硬者可與大承氣湯不硬者不可與

之也若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失穢氣則爲有燥屎乃可攻之若不轉失穢氣此但初頭鞭後必澹是尙未成鞭也不可攻之攻之必與氣乘虛上逆脹滿不能食也欲飲水者得水則噦亦由虛寒之氣上逆不能化水而下輸也若其後所發潮熱不退必是大便再鞭但已經下後所鞭者無多祇以小承氣湯和之可也故凡服承氣湯不轉失氣者慎不可攻也此蓋仲景戒人不可輕下之意

集註

方有執曰此以潮熱轉失氣次第而詳言之以決當下之候也轉失氣反屁出也脹滿藥寒之過也噦亦寒傷胃也

復鞭而少者重下故也未句重致叮嚀之意

喻昌曰若腹中氣仍不轉則不但用大承氣大差卽小承氣亦差矣

程知曰上條曰外欲解可攻裏曰外未解未可與承氣曰可與小承氣微和胃氣勿令大泄下此條曰可與曰不可與曰乃可攻之不可攻之曰少與小承氣曰以小承氣和之慎不可攻多少商量慎重之意故惟手足濇然汗出大便燥鞭者始主之以大承氣若小承氣猶是微和胃氣之法也

汪琥曰轉失氣則知其人大便已鞭腸胃中燥熱之甚故

其氣不外宣時轉而下不轉失氣則腸胃中雖有熱而滲孔未至於燥此但初頭鞭後必澀也

陽明病證語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣者勿更與之明日又不大便脈反微澀者裏虛也爲難治不可更與承氣湯也

註陽明病證語發潮熱脈滑而疾者是可攻之證脈也然無濇濇然之汗出與小便數大便鞭燥實等證則不可驟然攻之宜先與小承氣湯一升試之若腹中轉失穢氣則知腸中燥屎已鞭以藥少未能遽下所轉下者但屎之氣耳可更服一升促之自可下也若不轉失氣則勿更與服俟明

日仍不大便診其脈仍滑疾則更服之今脈反見微濇則
是裏虛無氣不能承送故爲難治所以不可更與承氣湯
也

集註

方有執曰滑以候食故爲大便鞭之診疾者屬裏熱也微
者陽氣不充無以運行濇者陰血不足無以潤送故曰陽
微不可下無血不可下此之謂也

張璐曰此條脈滑而疾有讖語潮熱而無鞭滿實證祇宜
以小承氣湯下之下之而脈反微濇證變裏虛故爲難治
傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發
潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕

而不安微喘直視脈弦者生瀉者死微者但發熱譫語者大承
氣湯主之若一服利則止後服

按

趙嗣真曰活人書云弦者陽也瀉者陰也陽病見陽脈者
生在仲景脈法中弦瀉屬陰不屬陽得無疑乎今觀本文
內脈弦者生之弦字當是滑字若是弦字弦爲陰負之脈
豈有必生之理惟滑脈爲陽始有生理滑者通瀉者塞凡
物理皆以通爲生塞爲死玩上條脈滑而疾者小承氣主
之脈微瀉者裏虛爲難治益見其誤

註

傷寒若吐若下後津液已亡而表不解邪因入裏不大便
五六日上至十餘日仍不大便日晡所發潮熱不惡寒者

此乃表邪悉罷裏熱漸深也仍宜大承氣湯蕩盡餘邪以存陰液自可愈也若因循失下以致獨語如見鬼狀病勢劇者則不識人循衣摸牀驚惕不安微喘直視見一切陽亢陰微孤陽無依神明擾亂之象當此之際惟診其脈滑者爲實堪下則生濇者爲虛難下則死若病勢微者但見潮熱譫語不大便之證而無前神昏等劇者宜以大承氣湯下之若一服利卽止後服蓋恐其過也

按

循衣摸牀危惡之候也一以陰氣未竭爲可治如太陽中風火劫變逆捻衣摸牀小便利者生不利者死是也一以陽熱之極爲可攻如陽明裏熱成實循衣摸牀脈滑者生

濇者死是也大抵此證多生於汗吐下後陽氣大虛精神失守經曰四肢者諸陽之本也陽虛故四肢痿亂失所倚也以獨參湯救之汗多者以參耆湯厥冷者以參附湯治之愈者不少不可概謂陽極陰竭也

集註

喻昌曰此條舉證語之勢重者爲言而勢重之中復分二

等劇者主死微者主生故以大承氣湯下之

程知曰婁全善治循衣摸牀每以補益得愈亦因其証證之不足也劉守真每以承氣治熱病法雖祖於仲景而辨證其未能如此詳悉故開後人鹵莽之端又曰喘則氣欲上脫微喘者邪實於內而又不能大喘也不識人循衣摸

牀心欲絕也動惕不安肝欲絕也微喘肺欲絕也直視腎欲絕也內經所謂三陰三陽五藏六府皆受病榮衛不行藏府不通故脈瀉者死也

汪琥曰日晡所發潮熱者府實燥甚故當其經氣旺時發潮熱也獨語者卽譫語也病人自言爲譫獨語如見鬼狀乃陽明府實而妄見妄聞劇者甚也成註云熱甚昏冒正氣故不識人循衣摸牀者陽熱偏勝而躁動於手也惕而不安者胃熱冲膈心神爲之不寧也又胃熱甚而氣上逆則喘直視則邪干臟矣故其生死之機須於脈候決之陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尙微煩不了了者此大

便必鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

註

陽明病本應自汗出醫誤以爲風邪更重發汗病已差尙微煩不了了者此大便必鞭故也然無或滿或痛之苦者以重汗亡津胃中乾燥故大便鞭本無宿食也則當問其小便日幾行若本一日三四行今日祇再行可知大便不久則出蓋小便數少則津液當還胃中故知不久必大便自出不須藥也

集註

方有執曰水穀入胃其精者爲津液粗者成糖澤水精液

出腸胃之外清者爲津液濁者外而爲汗下面爲小便
汗與小便過多者皆能奪乎津液所以檀樅之爲大便者
乾燥結鞭而難出也然二便者水穀分行之道路此通則
彼塞此塞則彼通小便出少則津液還停胃中必大便潤
而自出也

陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖鞭不可
攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大豬胆汁
皆可爲導

註此承上條詳其義以明其治也陽明病自汗出或發汗小
便自利者此爲津液內竭雖大便鞭而無滿痛之苦不可

攻之當待津液還胃自欲大便燥屎已至直腸難出肛門之時則用蜜煎潤竅滋燥導而利之或土灰根宜氣通燥或豬膽汁清熱潤燥皆可爲引導法擇而用之可也

集註

成無已曰津液內竭腸胃乾燥大便因難此非結熱故不可攻宜以潤藥外治而導引之

張璐曰凡條多汗傷津及屢經汗下不解或尺中脈遲弱元氣虛虛之人當攻而不可攻者並宜導法

程應旆曰小便自利者津液未還入胃中津液內竭而難故自欲大便但苦不能出耳須有此光景時方可從外導法漬潤其腸腸潤則水流就濕津液自歸還於胃故不難

大便通而小便亦從內轉矣

蜜煎導方

蜜七合一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺子令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

內臺方用蜜五合煎凝時加皂角末五錢釀捻作挺以豬膽汁或油潤穀道內之

豬膽汁方

大豬膽一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道內如一食頃當大便出宿食惡物甚效

內臺方不用醋以小竹管插入膽口留一頭用油潤內入穀道中以手將膽捻之其汁自入內此方用之甚便

土瓜根方

缺

按

土瓜卽俗名赤雹也時後方治大便不通採根搗汁用筒吹入肛門內此與上豬膽汁方同穀道內臺方用土瓜根削如挺內入穀道中誤矣蓋蜜挺入穀道能炸化而潤大便

土瓜根不能炸化如削挺用之恐失仲景製方之義

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯

註

少陰病得之二三日口燥咽乾急下之宜大承氣湯者乃

因熱勢甚速消灼腎水津液不能到咽故不必待其有可
下之證而急下之是下其熱以救將絕之水緩則腎水乾
竭陽必無依躁冒自焚而死也目中不了了而睛和者陰
證也睛不和者陽證也今傷寒六七日目中不了了睛不
和者是腎水爲冒陽所竭水既不能制火則火上熏於目
而眸子朦朧爲之不了了也此熱結神昏之漸危惡之候
也雖外無陽證惟身微熱內無滿痛祇大便難亦爲熱實
故曰此爲實也急以大承氣湯下之瀉陽救陰以全未竭
之水可也睛不和者謂睛不活動也

集註

方有執曰了了猶瞭瞭也素問曰陽明主肉其脈俠鼻絡

於目靈樞曰足陽明之正上循咽出於口還繫目系合於陽明也又曰足陽明之筋其支者上頸上俠口合於頰下結於鼻上合於太陽太陽爲目上綱陽明爲目下綱所以目中不了了睛不和知胃實也急下者任脈循面入目督脈上繫兩目中央諸脈皆屬於目而人之精神注焉是以宜急下也

喻昌曰少陰有急下三法以救腎水一本經水竭一本邪涌水一土邪凌水陽明亦有急下三法以救津液一汗多津越於外一腹滿津結於內一目睛不慧津枯於中合而經下法以觀病情生理如身在冰壺腹飲上池矣

張錫駒曰陽火亢極陰水欲枯故使目中不了了而睛不和急下之所以抑亢極之陽火而救垂絕之陰水也

魏荔彤曰陽明燥屎應下胃實應下俱詳考其脈證矣乃有表裏無他證獨於陽明胃脈所發見端倪處體認其證如傷寒六七日太陽已罷陽明已成其目昏暗朦昧若隔雲霧而不了了明白者此證名爲睛不和也陽明熱盛循經絡而發其昏朦之象以致睛失其光此內熱盛而爲實其機已兆兼以大便鞭而難身有微熱者則胃實已真故曰此爲實也急下之宜大承氣湯

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥

尿也宜大承氣湯

註

陽明病之人小便自利大便當鞭小便不利大便不鞭是知鞭不鞭不在熱不熱而在液之竭與不竭也今小便不利而大便乍難乍易者蓋熱將欲作結而液未竭也有時微熱者熱入裏也喘者熱乘肺也冒者熱乘心也不能臥者熱併陽也此皆一派熱結便鞭之徵神昏譫狂之漸雖無滿痛亦必有燥屎宜大承氣湯下之自愈也

集註

王三陽曰此證不宜妄動必以手按之臍腹有鞭塊喘冒不能臥方可攻之何也乍難乍易故也

林瀾曰既微熱時作喘冒不能臥則有燥屎已的自宜下

逐裏實爲急安可復以小便利屎定鞭始可攻之常法拘
哉

汪琥曰此條病未經下而有燥屎乃醫人不易識之證成
無已云小便利則大便鞭此有燥屎乃理之常今病人小
便不利大便乍難乍易何以知其有燥屎耶蓋大實大滿
之證則前後便皆不通大便爲燥屎壅塞其未堅結者或
有時而併出故乍易其極堅結者終著於大腸之中故乍
難燥屎結積於下濁氣攻衝於上以故時有微熱微熱者
熱伏於內不得發洩也後條辨云濁氣乘於心肺故旣胃
宜喘也不得臥者胃有燥屎所擾卽胃不和則臥不安也

凡此者皆是有燥屎之徵故云宜大承氣湯

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也

註病人不大便五六日繞臍痛者是腸胃中燥屎結無去路故繞臍痛也煩躁發作有時者是燥屎穢熱土攻則煩躁不攻則不煩躁故發作有時也不須以小承氣湯試之直以大承氣湯下其燥屎大便利自可愈也

集方有執曰病人謂凡有病之人而證犯如此者則皆當如註此治之此示人辨凡百胃實之大旨也

程應旂曰攻法必待有燥屎方不爲誤攻所以驗燥屎之

天下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯

此承上條以明其治也下之未盡仍當下之乃大下之後

印集卷之六

訂正傷寒論註陽明全篇

愈也

集註

程知曰大下之後宜乎病解矣乃復六七日不大便煩不

解而腹滿痛此必有燥屎未盡而然蓋宿食因熱復爲之
結鞭也

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹饑不能食但
頭汗出者梔子豉湯主之

註

陽明經病下之身熱未除手足溫不結胸者是所陷之邪
淺也心中懊憹饑不能食但頭汗出者是陽邪蒸鬱於胸
膈間也故宜梔子豉湯涌其熱也

集註

程知曰其外有熱者經邪未解也手足溫者熱入未深也

程應旌曰懊懣擾胃故饑不能食熱鬱氣蒸故但頭汗出
魏荔彤曰表邪未全入裏乃卽以爲胃實而遽下之則其
外仍有熱究不能隨下藥而蕩滌也於是雖熱而不潮手
足雖溫而無濺然之汗出則是在表者仍在表而下之徒
傷其裏耳卽不至於全在太陽者悞下成結胸而心下懊
懣饑不能食但頭汗出其陽明蒸蒸之熱爲陰寒之藥所
鬱俱凝塞於胸膈之上其證已昭然矣但病仍帶表旣不
可再下且已入裏又不可復發汗惟有主以梔子豉湯仍
從太陽治也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

註傷寒三陽多有嘔證以其風寒之表未除胸中陽氣爲寒所鬱故皆不可攻下也其乾嘔而惡寒發熱者屬太陽也喜嘔而寒熱往來者屬少陽也今雖祇有惡熱不惡寒大便鞭之陽明證而嘔多亦不可攻之其氣逆在上而未歛爲實也

集註沈明宗曰惡寒發熱之嘔屬太陽寒熱往來之嘔屬少陽但惡熱不惡寒之嘔屬陽明然嘔多則氣已上逆邪氣偏侵上脘或帶少陽故雖有陽明證慎不可攻也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也

註陽明謂陽明裏證中風謂太陽表證也口苦咽乾少陽熱證也腹滿陽明熱證也微喘發熱惡寒太陽傷寒證也脈浮而緊傷寒脈也此爲風寒兼傷表裏同病之證當審表裏施治太陽陽明病多則以桂枝加大黃湯兩解之少陽陽明病多則以大柴胡湯和而下之若惟從裏治而遽以腹滿一證爲熱入陽明而下之則表邪乘虛復陷故腹更滿也裏熱愈竭其液故小便難也

集註程知曰此言陽明兼有太陽少陽表邪卽不可攻也陽明中風熱邪也腹滿而喘熱入裏矣然喘而微則未全入裏也發熱惡寒脈浮而緊皆太陽未除之證口苦咽乾爲有

少陽之半表半裏若誤下之則表邪乘虛內陷而腹益滿矣兼以重亡津液故小便難也

程應旂曰此條與太陽大青龍證同太陽以風寒持其榮衛故有煩躁證而無腹滿證此以風寒持在陽明故有腹滿證而無煩躁證然口苦咽乾實與煩躁同其機兆也

陽明病衄浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反譏語若加溫鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加入參湯主之若衄浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之陽明病汗出多而

渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也

註

此承前條互發其義以明其治也前條表證居多戒不可誤下此條表裏混淆脈證錯雜不但不可誤下亦不可誤汗也若以脈浮而緊誤發其汗則奪液傷陰或加燒鍼必益助陽邪故讖語煩躁怵惕憤亂不眠也或以證之腹滿惡熱而誤下之則胃中空虛客氣邪熱擾動胸膈心中懊憹舌上生胎是皆誤下之過宜以梔子豉湯一涌而可安也若脈浮不緊證無懊憹惟發熱渴欲飲水口乾舌燥者爲太陽表邪已衰陽明燥熱正甚宜白虎加入參湯滋液以生津若發熱渴欲飲水小便不利者是陽明飲熱並盛

宜豬苓湯利水以滋乾然陽明病法當多汗因汗出多致小便少而渴者不可與豬苓湯蓋以汗多胃燥無水不能下行乃水涸之小便少非水蓄之小便不利也恐豬苓湯更利其小便則益竭津液而助燥矣

按

太陽病煩熱無汗而渴小便利者大青龍湯證也小便不利者小青龍湯去半夏加花粉茯苓證也太陽病煩熱有汗而渴小便利者桂枝合白虎湯證也小便不利者五苓散證陽明病煩熱無汗而渴小便利者宜葛根湯加石膏主之小便不利者以五苓散加石膏寒水石滑石主之陽明病煩熱有汗而渴小便利者宜白虎湯小便不利者以

豬苓湯少陽病寒熱無汗而渴小便利者當以小柴胡湯
去半夏加花粉小便不利者當以小柴胡湯加茯苓太陰
無渴少陰陽邪煩嘔小便赤而渴者以豬苓湯少陰陰邪
下利小便白而渴者以真武湯厥陰陽邪消渴者白虎加
人參湯厥陰陰邪轉屬陽明渴欲飲水者少少與之則愈
證既不同法亦各異當詳審而明辨之

集註

喻昌曰發熱以上與前條同而汗出不惡寒反惡熱身重
四者皆陽明之見證所以汗下燒鍼俱不可用舌上胎則
膈熱甚故湧以梔子豉而徹去其膈熱斯治太陽而無碍
陽明矣若前證更加口乾舌燥則宜用白虎湯以解熱生

津更加小便不利則宜以豬苓湯以導熱滋乾也其汗多而渴不可與豬苓湯者以熱邪傳入陽明必先耗其津液加以汗多復奪之於外又利小便更奪之於下則津液有立亡之患故示戒也

程應旼曰熱在上焦故用梔子豉湯熱在中焦故用白虎加人參湯熱在下焦故用豬苓湯

豬苓湯方

豬苓

去皮

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石

各一兩碎

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烱消溫服七合日三服

集解

趙羽皇曰仲景製豬苓一湯以行陽明少陰二經水熱然其旨全在益陰不專利水蓋傷寒表虛最忌亡陽而裏虛又患亡陰亡陰者亡腎中之陰與胃家之津液也故陰虛之人不但大便不可輕動卽小便亦忌下通倘陰虛過於滲利則津液反致耗竭方中阿膠質膏養陰而滋燥滑石性滑去熱而利水佐以二苓之滲瀉既疏濁熱而不留其壅瘀亦潤真陰而不苦其枯燥是利水而不傷陰之善劑也故利水之法於太陽用五苓者以太陽職司寒水故加桂以溫之是煖腎以行水也於陽明少陰用豬苓者以二經兩關津液特用阿膠滑石以潤之是滋養無形以行有

形也利水雖同寒溫迥別惟明者知之

脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令
洩數洩數則大便鞭汗多則熱愈汗少則便難脈遲尚未可攻

註

屬藏謂屬裏也屬府謂屬表也洩謂小便也脈浮而太
陽陽明脈也浮屬表太屬裏今太陽脈浮之表未解而心
下反鞭陽明之裏又急權乎汗下可也設裏有熱實攻之
無疑不須先汗以解外也如無熱實而有脈浮之表未但
不令攻之卽小便不利亦不令利小便仍當解外也蓋恐
洩數汗多亡其津液致大便鞭則熱愈實也若汗少脈遲
卽有便鞭裏尚未實亦未可攻也

集註

王肯堂口論言衄浮大反發汗反下之爲逆此以心下鞭
有熱知傳邪入裏故舍衄而從證也大便則許攻之小便
則不許利何也曰攻大便則內熱除利小便則津液傷也
林瀾曰心下鞭與腹鞭滿不同腹鞭邪已結聚成實此但
在心下白與非下不可者異矣腑與臟對舉而言凡一爲
入裏一猶屬表之義也

陽明病衄遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸
雖下之腹滿如故所以然者衄遲故也

註

陽明病不更衣已食如饑食輒腹滿衄數者則爲胃熱可
下證也今衄遲遲爲中寒中寒不能化穀所以雖饑欲食

食難用飽飽則煩悶是健運失度也清者阻於上升故頭眩濁者阻於下降故小便難食鬱濕痰此欲作穀疸之徵非陽明熱濕腹滿發黃者比雖下之腹滿暫減頃復如故所以然者脈遲中寒故也

集註

方有執曰遲爲寒不化穀故食難用飽濕鬱而蒸氣逆而不下行故微煩頭眩小便難也疸黃病也穀疸水穀之濕蒸發而身黃也

張璐曰下之腹滿如故蓋腹滿已是邪陷脈遲則胃不實徒下其糟粕病既不除而反害之耳夫陽明證本當下陽明而至腹痛尤當急下獨此一證下之腹滿必如故者緣

脈遲則胃氣空虛津液不充其清不過虛熱內壅非結熱當下之比也可見脈遲胃虛不但下之無益卽發汗利小便之法亦不可用惟當用和法如甘草乾薑湯先溫其中然後少與調胃微和胃氣可也

程應旌曰熱畜成黃之腹滿下之可去此則穀氣不得宣洩屬胃氣虛寒使然下之益虛其虛矣故腹滿如故

陽明病若中寒者不能食小便不利手足澀然汗出此欲作固瘕必大便初鞭後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也

註陽明病內熱則不大便能食小便利手足澀然汗出是可下之證也今中寒不能食小便不利雖手足澀然汗出不

可下也此爲中寒欲作固瘕何以知之以大便必初鞭而後溏也所以然者胃中虛冷水穀不分故小便不利而大便必溏也

按

不能食與上條食難用飽同一不能腐熟水穀也小便不利與上條小便難同一不能下輸膀胱也惟手足濇然汗出與上條飽則微煩頭眩不同彼欲作穀疸此欲作固瘕皆胃中寒冷一以微煩頭眩陽在中上故不病瀉而病疸一以手足汗出陽在四肢故不病疸而病瀉也再上條中寒食難用飽無汗小便難欲作穀疸以其尚能少食微煩猶有陽氣故也此條中寒不能食手足冷汗小便不利

作固瘕則是寒濕不化純陰故也固瘕者大瘕瀉也俗謂之溏瀉固者久而不止之謂也

按

人之汗以天地之雨名之陰陽和而後有雨陽亢則熱而雨少陰盛則寒而雨多人之汗亦若是也四肢手足屬土土主脾胃若脈大其汗蒸蒸而熱則爲陽盛可下之證也若脈遲其汗漿漿而寒則爲陰盛可溫之證也

集註

程應旂曰水穀不別屬濕熱偏滲者多此點出胃中冷欲人知病本於寒宜從寒治不在小便也

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽

明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散

按但以法救之五字當是若小便不利方與上文小便數下文渴者之義相合此條病勢不急救之之文殊覺無謂必有遺誤王三陽亦云此處五苓散難用不然經文渴者之下當有闕文也

註太陽病脈浮緩而弱中風脈也發熱汗出惡寒中風證也不嘔則裏氣和緣何而有心下痞證此必以胃下之故也如其不經醫下邪熱自傳於裏病人不惡寒而渴者此邪去太陽已轉屬陽明也若小便數者大便必鞭然使不更

衣十餘日而無或滿或痛之苦是仍屬虛燥不實之鞭不可議下俟之可也如或渴欲飲水必是胃中乾燥當少少與之以滋其胃可耳其或小便利而渴者是又爲水停不化宜五苓散以導其所停之水矣蓋病在膀胱故仍治太陽而不治陽明也

集注

張兼善曰十日不更衣而不用攻伐何也曰此非結熱雖不大便而無潮熱讞語可下之證當須審慎勿以日數久而輒爲攻下也

喻昌曰寸緩關浮尺弱發熱汗出惡寒純是太陽中風未罷之證設非誤下何得心下痞結耶如不誤下而太陽證

必漸傳經乃至不惡寒而渴邪入陽明審矣然陽明津液既偏滲於小便則大腸失其潤而大便鞭與腸中熱結自是不同所以旬日不更衣無所苦也

汪琥曰小便數大便鞭仲景論中何以無治法耶蓋此正是仲景不須用藥處俟其陰陽自和則小便漸少大便必自出也

陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈

註

此申上條痞鞭不更衣十日無所苦誤攻之變也陽明病非胃家實而心下鞭滿者不可攻之若攻之其人利不止者則正脫而死其人利自止者邪退則猶可愈也

集註

汪琥曰或問結胸證同是心下鞭滿又屬可下何也蓋結

胸證心下鞭滿而痛者爲胃中實故可下此證不痛當是
虛鞭虛滿與半夏瀉心湯之心下痞鞭客同故云不可攻
也

諸虛者不可下下之則大渴求水者易愈惡水者劇

註

虛者下之是爲重虛陰津消亡自然大渴其求水者陽氣

猶存故易愈若惡水者陽氣已絕則難愈矣

集註

程應旌曰諸虛者陽津陰液必有所亡故下之則大渴求

水者亡陰惡水者亡陽故有愈劇之分觀此知仲景慮誤
下之助陰甚於慮誤下之亡陰矣

大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈

註大下之後復發其汗重亡津液小便當少以水液內竭故也勿治之言勿利其小便也須俟津液回而小便利必自愈矣

集程知曰言下後復發汗有俟津液自回之法若強責其小便則膀胱之氣化不行有增鞭滿喘脹明矣故宜以不治治之

陽明病下血譫語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濺然汗出則愈

婦人病傷寒經血適至則有熱入血室之證宜刺期門男
子病傷寒有下血譫語者亦爲熱入血室也若熱隨血去
必通身汗出而解矣若血已止其熱不去蓄於陽明不得
外越而上蒸但頭汗出而不解者亦當刺期門隨其實而
瀉之則亦必通身濺然汗出而愈也

集註

方有執曰血室頭汗期門註皆見太陽篇中陽明之脈其
直者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣街中血室之脈起於
氣街上行至胸中而散所以婦人經來熱入血室則似結
胸而譫語從陽明裏也男子下血熱入血室但頭汗出亦
譫語從陽明外也故並宜刺期門

程應旌曰下血則經脈空虛熱得乘虛而入血室譏語以血室雖衝脈所屬而心經實血室之主室被熱擾故心神不清也但頭汗出者血下奪則無汗熱上擾則汗蒸也刺期門者熱入陰分實在陰隨其實而瀉之則榮氣和而心氣下通故濺然汗出而解

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

註

陽明屬胃開竅於口陽明有熱故口燥也但欲漱水不欲嚥者雖燥而不渴知熱在經而不在府在血而不在氣也然在經血迫血妄行必致衄也

集註

喻昌曰口中乾燥與渴異漱水不欲嚥知不渴也陽明病

口燥但漱水不欲嚥知邪入血分陽明之脈起於鼻故知
血得熱而妄行必由鼻而出也

沈明宗曰陽明病口燥漱水而不欲嚥乃邪鬱於經未入
於府也

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

註

此承上條詳出脈證以互發其義也陽明病脈浮發熱口
鼻乾燥熱在經也若其人能食則爲胃和胃和則邪當還
表作解也然還表作解不解於衛則解於榮汗出而解者
從衛解也衄血而解者從榮解也今既能食衄血則知欲
從榮解也

集註

張錫駒曰此論陽明經脈燥熱也夫熱在經脈故脈浮發

熱熱循陽明經脈而上故口乾鼻燥不傷胃氣故能食能

食者則衄言病不在胃府非因能食而致衄也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜
忘屎雖鞭大便反易其色必黑者宜抵當湯下之

詩

經曰血併於下亂而喜忘喜忘者好忘前言往事也今陽

明病其人喜忘者本有久瘀之血與熱上併於心故令喜
忘也畜血之屎雖鞭然大便反易其色必黑蓋以血與糟
粕共併故反易而色黑也不用桃仁承氣湯而用抵當湯
大下之者以其人本有久瘀之血故也

集註

張志聰曰太陽畜血在膀胱故驗其小便之利與不利陽

明畜血在腸胃故驗其大便之黑與不黑

張璐曰大便色黑雖曰瘀血而燥結亦黑但瘀血則黏如

漆燥結則晦如煤此爲明辨也

鄭重光曰太陽熱結膀胱證輕者如狂重者發狂如狂者
血自下故用桃仁承氣湯因勢而利導之發狂者血不下
須用抵當湯此條喜忘差減於狂乃用發狂之重劑何也
蓋太陽經少血陽明經多血所以宜用抵當湯峻攻太陽
云主之乃確然不易之法此云宜用則證有輕重在於臨
時酌量耳

病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯若脈數不解而下不止必協熱便膿血也

註

此承上條言畜血喜忘熱結而無表裏證者當下之義也病人無表裏證是無太陽表陽明裏證也但發熱而無惡寒七八日雖脈浮數不可汗也若屎鞭可下之假令已下脈不浮而數不解是表熱去裏熱未去也至六七日又不大便若不能消穀善饑是胃實熱也以大承氣湯下之今既能消穀善饑是胃和合熱非胃邪合熱故屎雖鞭色必黑乃有瘀血熱結之不大便也宜用抵當湯下之若脈數

不解不大便鞭而下利不止必有久瘀也腐化而便膿血也則不宜用抵當湯下之矣

集註

張璐曰病雖七八日尙發熱脈浮數仍屬太陽表證因誤下引邪內入所以脈數不解內外合邪而見消穀善饑穀入既多反至六七日不大便且不煩渴是知其證非熱結在胃乃熱結在血以其表證誤下尚兼太陽隨經之熱未盡故以抵當爲至當也若脈數不解而下利不止又當隨其下血與不下血而異治之倘血分之熱邪不除必協熱而便膿血也

傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲

不可下也於寒濕中求之

註傷寒發汗已身目爲黃所以然者以表有寒裏有濕未解也夫表寒裏濕鬱而發黃自非熱濕內瘀鬱而成黃者比故不可下惟當於表寒裏濕中求其治法宜發其表寒利其裏濕可也

集註

喻昌曰傷寒發汗已熱邪解矣何由反蒸身目爲黃所以然者寒濕搏聚適在軀殼之裏故爾發黃也裏者在內之通稱非謂寒濕深入在裏蓋身目正屬軀殼與藏府無關也於寒濕中求之求其寒濕中之治法也

程應旂曰其人素有濕邪在裏表寒雖經發汗而其爲裏

濕所持者終在裏而無從解散也發汗後之寒與濕
爲熱非實熱也故不可下仍當於寒濕中責其或淺或深
而治之可也

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軀赤小豆湯主之

註

傷寒表邪未解適遇其人陽明素有濕邪熱入裏而與濕
合濕熱蒸瘀外薄肌表身必發黃也若其人頭有汗小便
不利大便艱則或清或下或利小便自可愈也今乃無汗
小便利是裏之瘀熱未深表之鬱遏猶甚故用麻黃連軀
赤小豆湯外發其表內逐其濕也

集註

喻昌曰傷寒之邪得濕而不行所以熱瘀身中而發黃設

泥裏字豈有邪在裏而反治其表之理哉

程應旆曰凡傷寒瘀熱在裏者由濕蒸而來故身必發黃此之瘀熱未深祇從表一邊開其鬱滯而散除濕熱麻黃連軀赤小豆湯是其主也

林瀾曰麻黃連軀一證雖曰在裏必因邪氣在表之時有失解散今雖發黃猶宜兼汗解以治之也

汪琥曰夫寒邪自外而來若挾內濕瘀於經絡之中則鬱而變熱故令其人身目發黃也此條乃是太陽經傳來者太陽傷寒理宜用麻黃湯祇因邪傳陽明熱瘀於裏裏非胃府以陽明經居太陽之裏卽尙論篇所云軀殼之裏是

也惟其裏有熱所以方中用麻黃湯而去桂枝之辛熱更
加赤小豆薤白之甘辛以祛散在表之寒濕復加連軺生
梓白皮之苦寒以清解肌裏之瘀熱也

麻黃連軺赤小豆湯方

麻黃

二兩
去節

赤小豆

一升

杏仁

四十枚
去皮尖

生薑

二兩
切

甘草

二兩
炙

連軺

二兩

大棗

十二枚
擘

生梓白皮

一升
切

已上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮
取三升分溫三服半日則盡

方解

濕熱發黃無表裏證熱盛者清之小便不利者利之裏實
者下之表實者汗之皆無非為病求去路也用麻黃湯以

開其表使黃從外而散去桂枝者避其熱也佐薑棗者和其榮衛也加連軹梓皮以瀉其熱赤小豆以利其濕共成治表實發黃之效也連軹卽連翹根無梓皮以茵陳代之

集解

周揚俊曰此亦兩解表裏法也故用外汗之藥必兼溼濕

之味傷寒發黃者必其入太陰素有濕熱更兼寒邪未散兩邪相合因而蒸鬱爲黃也

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

註

身黃濕熱之爲病也濕盛於熱則黃色晦熱盛於濕則黃色明如橘子色者謂黃色明也傷寒七八日身黃色明小

便不利其腹微滿此裏熱深也故以茵陳蒿湯治疸病者爲君佐以大黃使以梔子令濕熱從大小二便瀉出則身黃腹滿自可除矣

集註唐不巖曰熏黃陰黃也橘子黃陽黃也

程知曰此驅濕除熱法也傷寒七八日可下之時小便不利腹微滿可下之證兼以黃色鮮明則爲三陽入裏之邪無疑故以茵陳除濕梔子清熱用大黃以助其驅除此證之可下者猶必以除濕爲主而不專取乎攻下有如此者

茵陳蒿湯方

茵陳蒿 六兩

梔子 十四枚

大黃 二兩 去皮

右三味以水一斗二升先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分三服小便當利尿如皂莢汁狀色正赤一宿腹減黃從小便出也

傷寒身黃發熱梔子蘘皮湯主之

註

傷寒身黃發熱者設有無汗之表宜用麻黃連軹赤小豆汗之可也若有成實之裏宜用茵陳蒿湯下之亦可也今外無可汗之表證內無可下之裏證故惟宜以梔子蘘皮湯清之也

集

林瀾曰傷寒身黃胃有瘀熱須當下之此以發熱而熱未實故宜梔子蘘皮湯解之

汪琥曰身黃兼發熱者乃黃證中之發熱而非麻黃桂枝證之發熱也熱既鬱而發黃雖表而非純乎表證但當清其鬱以退其黃則發熱自愈

魏荔彤曰此三條雖皆外寒挾濕之邪瘀而成熱之證然在表在裏濕勝熱勝尤當加意也豈可槩以爲裏證而濕下耶

梔子蘗皮湯方

梔子 十五枚

甘草 一兩

黃蘗 二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

按此方之甘草當是茵陳蒿必傳寫之誤也

陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發黃

註

陽明病無汗不以葛根湯發其汗而以火劫取汗致熱盛津乾引飲水停爲熱上蒸故額上微汗出而周身反不得汗也若小便利則從燥化必煩渴宜白虎湯小便不利則從濕化必發黃宜茵陳蒿湯

集註

喻昌曰陽明病濕停熱鬱而煩渴有加勢必發黃然汗出熱從外越則黃可免小便多熱從下洩則黃可免若誤攻之其熱邪愈陷清液愈傷而汗與小便愈不可得矣誤火之則熱邪愈熾津液上奔額雖微汗而周身之汗與小便愈不可得矣發黃之變安能免乎

程知曰太陽發黃由寒鬱濕濕不得解陽明發黃由濕瘀熱熱不得越故宜分經論治

陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃

註

陽明病無汗以熱無從外越也小便不利濕不能下泄也心中懊憹濕瘀熱鬱於裏也故身必發黃宜麻黃連軀赤小豆湯外發內利可也若經汗吐下後或小便利而心中懊憹者乃熱鬱也非濕瘀也便鞭者宜調胃承氣湯下之便軟者宜梔子豉湯涌之可也

集註

方有執曰無汗小便不利則濕停懊憹濕停熱鬱所以知必發黃也

張璐曰外不得汗下不得瀉而濕熱鬱於胸中不得泄勢必蒸身爲黃也

陽明病面合色赤不可攻之必發熱色黃小便不利也

註

陽明經病面合當色赤是熱邪猶怫鬱在經尙未入裏而成實也故雖不大便不可攻之若攻之則怫鬱在經之邪不解必令發熱色黃若其人裏燥小便利則同燥化當不發黃而必大便鞭矣

集註

方有執曰合應也赤熱色也胃熱上行面應赤色攻則亡津液故發熱色黃因小便不利也

程知曰言熱在陽明之經不可攻也熱在於經陽氣怫鬱

在表也攻之則經中之熱未得表散必發熱色黃曰小便不利也

程應旄曰熱阻於肌膚之間故發熱而小便爲之不利鬱而成黃也

陽明病發熱汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者此爲瘧熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之

註陽明病發熱汗出者此爲熱越小便若利大便因鞭不能發黃也但頭汗出身無汗是陽明之熱不得外越而上蒸也小便不利濕蓄膀胱也渴飲水漿熱灼胃府也此爲濕

熱瘀蓄在裏外薄肌膚故身必發黃也茵陳蒿湯主之者
通利大小二便使濕熱從下竅而出也

集註

方有執曰越散也頭汗瘀熱發黃註皆見太陽篇中茵陳
逐濕瘀之黃梔子除胃家之熱大黃推壅塞之瘀三物者
苦以泄熱泄熱則黃散矣

程應旆曰頭汗出身無汗劑頸而還足微陽熱之氣鬱結
於內而不得越故但上蒸於頭頭爲諸陽之首故也氣不
下達故小便不利府氣過燥故渴飲水漿瘀熱在裏指無
汗言無汗而小便利者屬寒無汗而小便不利者屬濕熱
兩邪交鬱不能宣泄故食而發黃解熱除濕無如茵陳梔

子清上大黃滌下通身之熱得泄又何黃之不散耶

傷寒脈浮而緩手足自溫者是爲繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者爲陽明病也

註此太陰轉屬陽明證也傷寒脈浮緩手足熱者太陽也今手足自溫非太陽證是爲繫在太陰也然太陰脈當沉緩今脈浮緩乃太陽脈也證太陰而脈太陽是邪由太陽傳太陰也故曰繫在太陰也若小便自利者則不從太陰濕化而發黃至七八日大便鞭者則是從燥化此爲陽明也

集註

程應旂曰陽明爲病本於胃家實胃家之實不特三陽受

邪能致其轉屬陽明卽三陰受邪亦能致其轉屬陽明聊

舉太陰一經例之。脈浮而緩，是爲表脈。然無發熱、頭痛、惡寒等外證，而手足祇溫，是邪不在表而在裏。但入裏有陰陽之分，須以小便別之。小便不利，濕蒸熱瘀而發黃；以其人胃中原無燥氣也。小便自利者，胃乾便鞭而成實，以其胃中本有燥氣也。病雖成於七八日，而其始證却脈浮而緩，手足自溫，實是太陰轉屬而來也。卽太陰陽明推之，少陰三大承氣證，厥陰一小承氣證，何非轉屬陽明之病哉？

魏荔彤曰：病在太陽，熱爲濕鬱，開聚於裏，必有歸著。旣不能發黃，小便自利，則邪何歸乎？不得不歸之於萬物所歸之胃。至於七八日，小便自多，大便自鞭而爲陽明病矣。

傷寒轉繫陽明者其人譫然微汗出也

註

凡傷寒無論三陰三陽若轉繫陽明其人必有譫然微汗出之證始爲轉屬陽明也

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此爲吐之內煩也

註

太陽病吐之表解者當不惡寒裏解者亦不惡熱今反不惡寒不欲近衣者是惡熱也此山吐之後表解裏不解內生煩熱也蓋無汗煩熱熱在表大青龍證也有汗煩熱熱在裏白虎湯證也吐下後心中懊憹無汗煩熱大便雖鞭熱猶在內梔子豉湯證也有汗煩熱大便已鞭熱悉入府

調胃承氣湯證也今因吐後內生煩熱是爲氣液已傷之
虛煩非未經汗下之實煩也已上之法皆不可施惟宜用
竹葉石膏湯於益氣生津中清熱寧煩可也

集註

張璐曰此以吐而傷胃中之液故內煩不欲近衣雖顯虛
煩之證較關上蠟細數而成虛熱脾胃兩傷者稍輕雖不
致逆亦誤吐之過也

太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上蠟細數者
以醫吐之過也一二日吐之者腹中饑口不能食三四日吐之
者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此爲小逆
按飲食冷食之下當有五六日吐之者六字若無此一句則

不喜糜粥欲食冷食與朝食暮吐之文不相聯屬且以上文一二日三四日之文細玩之則可知必有五六日吐之一句由淺及深之謂也

註

太陽病不解當惡寒發熱今自汗出不惡寒發熱是表已解也關上脈細數胃不和也細者胃氣虛數者胃氣熱證脈不和詢其故知以醫吐之過也一二日病在太陽正氣未衰吐之者傷胃未深故腹中知饑口不能食也三四日病在陽明胃中已熱吐之者復傷津液故不喜糜粥欲食冷食也五六日病將轉入陰經正氣已衰吐之者胃中虛冷故朝食暮吐也此皆醫吐之所致尚在可治故曰此爲

小逆也

集註

程知曰本太陽病醫吐之則表邪乘虛傳入陽明傷動胃

氣而關脈細數矣

程應旂曰陽明之氣下行爲順上行爲逆以醫吐之所致則非脾胃本來之病此爲小逆更勿誤治使小逆變成大逆也

食穀欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也

註

食穀欲嘔屬陽明者以胃主受納也今胃中寒不能納穀

故欲嘔也以吳茱萸湯溫中降逆而止其嘔可也若得湯

反劇者此必非中焦陽明之裏寒乃上焦太陽之表熱也

吳茱萸氣味俱熱藥病不合故反劇也法當從太陽陽明

合病不下利但嘔之例治之宜葛根加半夏湯

集註

方有執曰食穀欲嘔胃寒也故曰屬陽明言與惡寒嘔逆

不同也上焦以膈言也

病人衄數數爲熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微
膈氣虛衄乃數也數爲客熱不能消穀以胃中虛冷故吐也

註

病人衄數數爲有熱則當消穀引食今食而反吐者蓋以
身熱衄數誤爲表熱而發其汗因使其人陽氣微膈氣虛
也不知此衄之數乃外邪客熱之數非胃中實熱之數也
其不能消穀食而反吐者乃胃中本虛冷故耳

集註

程知曰此言汗後嘔數吐食當責胃之陽虛也陽受氣於胸中發汗過多令陽氣微膈氣虛客熱外越故嘔數也客熱不能消穀而吐者當責其胃之虛冷若因其數而投以清胃之藥則左矣

程應旄曰見數嘔而反吐者數爲熱嘔無力則爲虛嘔膈虛陽客於上不能下溫故令胃中虛冷熱爲客熱寒爲真寒究其根由祇由發汗令陽氣微然則陽氣之珍重何如而可誤汗乎

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛攻其熱必噦

註

陽明病不能食者爲中寒卽有脈數客熱上條旣戒以不可汗此又言亦不可攻若攻其熱則寒其胃陽亦必作噦矣所以然者客熱雖除胃亦虛冷故也以其人本來胃虛故攻其熱必噦噦卽乾嘔也

集註

方有執曰攻熱皆寒藥故知必噦胃中虛以不能食言此亦戒謹之意

林瀾曰陽明譫語潮熱不能食者可攻由燥屎在內也乃亦有胃中虛冷不能食者須詳別之未可便以不能食爲實證也若誤攻之熱去噦作矣然則安得以陽明槩爲宜下哉

若胃中虛冷不能食者飲水則噦

註

此承上條不攻亦噦之義也若其人胃中虛冷不能食者雖不攻其熱飲水則噦蓋以胃既虛冷復得水寒故噦也宜理中湯加丁香吳茱萸黃溫而降之可也

集註

喻昌曰表熱裏寒法當先救其裏太陽經中亦用四逆湯其在陽明更可知矣此條比前條虛寒更甚故不但攻其熱必噦即飲水亦噦也

汪琥曰若胃中虛冷不能食飲水則水寒相搏氣逆兩赤爲噦矣法當大溫

跌陽脈浮浮則爲虛浮虛相搏故令氣餒言胃氣虛竭也

則爲噦此爲醫咎責虛取實守空迫血衄浮鼻中燥者必衄血之

註

誤攻飲冷皆可致衄固矣今跌陽胃衄浮而不大無力而虛則是胃虛與邪相搏卽不誤下飲冷亦令衄也若跌陽胃衄滑則爲噦者乃熱氣擁鬱之衄非胃氣虛竭之衄醫何可取實責虛以自取其咎耶若跌陽胃衄浮而鼻中燥者此熱據榮分榮熱迫血妄行必作衄也世有以噦爲呃逆者不知噦卽乾嘔也以其有噦噦之聲故又名噦也觀今病呃逆之人與飲冷水則氣自臍下衝上出口而作格兒格兒之聲聲長時止者爲實可治聲短不已者爲虛難

治

集註

方有執曰此又出跌陽脈而以臧與衄言皆逼汗而不得汗之所致也咎過愆也責虛言求病於虛取實言反以虛爲實而攻取之也血屬陰而爲內守故曰守空迫血言劫汗也

寸口脈浮大而醫反下之此守大逆浮則無血大則爲寒寒氣相搏則爲腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人必餒

按

令汗大出四字當是衍文

註

寸口脈浮大指六脈皆浮大也六脈皆浮大則非陽明按

之大脈乃太陽不按之大脈也醫反下之此爲大逆則從前浮脈變而爲無血之虛大脈變而爲胃冷之遲虛寒相搏則爲腸鳴醫乃不知而反與飲冷水其人得水寒之氣冷與虛相搏於胃中故必餒也餒者氣餒結有聲卽今之呃逆也

集註

程知即言邪氣在表妄下之變也寸口浮大而無鞭滿藏熱之證法應發汗若反下之此爲大逆既經妄下則所謂浮者至於內空而無血所謂大者變爲裏虛而有寒虛寒相搏則爲腸鳴醫見脈大以爲有熱飲以冷水欲以水寒勝熱而作汗裏先虛寒又得冷水與之相搏則冷結上焦

必至咽噎塞而氣逆矣

傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

註

傷寒噦而不腹滿者為正氣虛吳茱萸湯證也噦而腹滿者為邪氣實視其二便何部不利利之則愈也

集註

成無已曰噦而腹滿氣上而不下也視其前後有不利者即利之以降其氣前部小便也後部大便也

程知曰前部不利後人治以五苓後部不利後人治以承氣是也

沈明宗曰邪傳於胃胃氣壅遏兩氣相搏氣逆上衝則為噦矣

張錫駒曰傷寒至噦非胃氣敗卽胃中寒然亦有裏實不通氣不得下洩反上逆而爲噦者當詳辨之

夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語也

註

譫語一證有虛有實實則譫語陽明熱甚上乘於心亂言無次其聲高朗邪氣實也虛則鄭聲精神衰乏不能自主語言重複其聲微短正氣虛也

集註

戴元禮曰譫語屬陽鄭聲屬陰經曰實則譫語虛則鄭聲譫語者顛倒錯亂言出無倫常對空獨語如見鬼狀鄭聲者鄭重頻煩語雖謬而諄諄不已老年人遇事則諄語不休以陽氣虛不精明也此譫語鄭聲虛實之所以不同也

二者本不難辨但陽盛裏實與陰盛格陽皆能錯語須以他證別之隨證施治可也

婁全善曰余用參耆歸朮等劑治譫語得愈者甚多豈可不分虛實一槩用黃連解毒大小承氣等湯以治之乎按其所云亦鄭聲也

張錫駒曰實則譫語者陽明燥熱甚而神昏氣亂故不避親疎妄言罵詈也虛則鄭聲者神氣虛而不能自主故聲音不正而語言重複也

傷寒四五日脈沉而喘滿沉爲在裏而反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實久則譫語

註傷寒四五日入裏之時也。脈沉而喘滿，乃在裏之端。而反發其汗，津液越出，則表虛也。汗出胃乾，大便爲難，則裏實也。久則胃熱熾盛，必發譫語也。

集註

方有執曰：越出謂枉道而出也。

張璐曰：傷寒四五日正邪熱傳裏之時，况見脈沉在裏之喘滿而反汗之，必致燥結譫語矣。蓋燥結譫語頗似大承氣證，此以過汗傷津而不致大實大滿，腹痛祇宜小承氣爲允當耳。

陽明病其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必鞭，鞭則譫語小承氣湯主之。若一服譫語止者，更莫復服。

註

此詳上條以明其治也陽明病其人多汗以津液外出胃中乾燥大便秘輒久則譫語宜以小承氣湯主之若一服利譫語止慎不可更服也

集註

張璐曰多汗譫語下證急矣以其人汗出既多津液外耗故不宜大下但當畧與小承氣湯和其胃氣譫語自止若過服反傷津液也

沈明宗曰此汗多胃燥非同實治也

汗出譫語者以有燥屎在胃中此爲風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈宜大承氣湯

註

病自汗出而譫語者以素有燥屎在胃中此爲太陽風邪

之所傳也須當下之然必須太陽之邪已過陽明之經而入陽明之府乃可下之若下之早則裏熱未結不但熱去不盡且虛其中熱乘虛而上干於心語言必亂此表虛汗出裏實譫語所以必待過經入府而後下之則愈宜大承氣湯

集註

方有執曰過經謂寧遲遲非謂必待十三日後也

程知曰此言譫語不當下早也既出汗矣而譫語則必有燥屎在胃此當屬風風爲陽邪陽邪入裏故譫語然須六七日乃可下之下之早則風邪未解於表盡入於裏裏邪燥實語言更亂也

陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭爾宜大承氣湯下之

按宜大承氣湯下之句應在必有燥屎五六枚之下始合當用大承氣湯下之之義若但便鞭而用大承氣湯下之殊失仲景顧慮悞下慎下之旨

註陽明病譫語有潮熱反不能食者知胃中必有燥屎已結實也宜大承氣湯下之若能食者知胃將和在大便鞭耳當導之不可下也

集張璐曰此以能食不能食辨燥結之微甚也潮熱譫語皆胃中熱甚所致胃熱則能消穀今反不能食此必熱傷胃

中津液氣化不能下行燥屎逆攻於胃之故宜大承氣湯
急祛亢極之陽以救垂絕之陰若能食者胃中氣化自行
熱邪不盛津液不致大傷大便雖鞭不久自行不必用藥
反傷其氣也

下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯

註

下利裏虛譫語裏實若脈滑大證兼裏急知其中必有宿
食也其下利之物又必稠粘臭穢知熱與宿食合而爲之
也此可決其有燥屎也宜以小承氣湯下之於此推之可
知燥屎不在大便鞭與不鞭而在裏之急與不急便之臭
與不臭也

集註

汪琥曰下利者腸胃之疾也若譫語則胃家實與厥陰無
與乃腸中有燥屎不得下也治宜小承氣湯者此半利半
結祇須緩以攻之也又曰或問既下利矣則熱氣得以下
泄何由而致譫語有燥屎也答曰此係陽明府實大熱之
證胃中糟粕為邪所壅留著於內其未成鞭者或時得下
其已成鞭者終不得出則燥屎為下利之根燥屎不得出
則邪熱上乘於心所以譫語要之此證須以手按臍腹當
必堅痛方為有燥屎之徵

直視譫語喘滿者死下利者亦死

註

上條下利譫語為可治此條下利譫語者死要知譫語不

死於下利而死於直視也直視者精不注乎目也譫語者神不守乎心也已屬惡候加之喘滿陽上脫也故曰死下利陰下脫也故曰亦死也

集註

方有執曰直視精不榮於目也譫語神不主乎心也喘則陽爭於上利則陰爭於下胃中土也陰陽爭奪於上下而中氣不守故無法可治而皆主死也

發汗多若重發汗者亡其陽譫語衄短者死衄白和者不死

註

太陽病發汗過多不解又復重發其汗以致氣液兩亡熱邪乘燥傳入陽明而生譫語譫語者胃熱陽也衄短者氣衰陰也陽病見陰衄爲陰勝於陽故死也若衄不短爲陰

陽自和故不死也

集註

喻昌曰方註以此爲太陽經脫衛不知太陽經無譏語之
例必日久而兼陽明少陽方有譏語故此言太陽經得病
時發汗過多及傳陽明時重發其汗因有亡陽而譏語之
一證也亡陽之人所存者陰氣耳故神魂不定而妄見妄
聞與熱邪乘心之候不同衾短則陰陽不附衾和則陰陽
未離其生死但從衾定耳

汪琥曰譏語者衾當大實或洪滑爲自和自和者言衾與
病不相背也病雖甚不死若譏語衾短爲邪熱盛正氣衰
乃陽證見陰衾也無法可施

發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈

註

此又承上條以出其治也譫語者屬陽明熱實可下之證也若發汗過多亡氣液而發譫語者乃津枯致燥之譫語非熱甚內實之譫語不可下也裏有熱宜白虎加人參湯表不解與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈也

按

發汗過多亡陽譫語以無大便鞭滿痛故不可下以無身寒汗出惡寒故不可溫於此可知發太陽汗出過多致譫語者必無發熱汗出惡寒也發陽明汗出過多致譫語者必有潮熱惡熱不大便也此則發少陽汗多致譫語者即

論中少陽不可發汗發汗則譫語是也然舍少柴胡湯別
無治法若祇用柴胡又恐升散非亡陽所宜故合桂枝和
其榮衛通其津液自可愈也

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不
通鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳
前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈
但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治

按

續浮之浮字當是弦字始與文義相屬則可與小柴胡湯
若俱是浮字則上之浮既宜用小柴胡湯下之浮又如何
用麻黃湯耶

註

中風傳陽明病太陽未罷脈當浮緩今脈弦浮大弦少則
脈也浮太陽脈也太陽明脈也脈既兼見證亦如之煩滿
太陽陽明證也脇下及心痛久按之氣不通快少陽證也
鼻乾陽明證也不得汗太陽證也嗜臥少陰證也面目悉
黃太陰證也小便難太陽府證也潮熱陽明裏證也噦逆
胃敗證也耳前後腫少陽證也短氣氣衰證也凡仲景立
法無方之條皆是此等陰陽錯雜表裏混淆之證但教人
俟其病勢所向乘機而施治也故用刺法待其小差若外
病不解已成危候如過十日脈續弦不浮者則邪機已向
少陽可與小柴胡湯和之使陽明之邪從少陽而解若脈

但浮不大而無餘證者則邪機已向太陽當與麻黃湯汗之使陽明之邪從太陽而解若已過十餘日病勢不減又不歸於胃而成實更加不尿腹滿臑甚等逆卽有一二可下之證胃氣已敗不可治也

集註

程知曰此條全是表證未解而無汗出燥渴之證故不可用白虎雖有潮熱而無鞭滿譫語濇濇汗出之證故不可用承氣不如俟氣之自回猶可漸引其邪從外出也

程應旂曰此條證以不得汗三字爲主故酌量於柴胡麻黃二湯間以通其久閉總是要得汗耳

脈浮而芤浮爲陽芤爲陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕

汗出而浮為陽盛，汗出為陰虛。陽盛則發熱，陰虛則汗出。二者相搏，則胃氣生熱，愈盛。胃中津液立亡，其陽則絕者，言陽亡，津液絕也。

集註

方有執曰：浮為氣上行，故曰陽；芤為血內損，故曰陰。胃中生熱者，陰不足以和陽，津液乾而成枯燥也。

張璐曰：此言脾約當下，不下則浮，濇轉為浮，芤津液竭而難下矣。其陽則絕，即陽絕於裏，亡津液之互辭也。

趙良曰：胃中陽熱亢甚，脾無陰氣以和之，孤陽無偶，不至燔灼竭絕不止耳。

沈明宗曰：此辨陽明津竭之脈也。浮為邪氣強，芤為陰血

虛陽邪盛而陰血虛爲浮芤相搏胃氣生熱故曰其陽則
絕卽亡津液之互詞也若見此脈當養津液不可便攻也
陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛
若不欬不嘔手足不厥者頭不痛

註

陽明病法多汗反無汗而小便利是寒氣內攻也至二三
日嘔而欬寒邪上逆也手足厥者寒氣見於四支也氣上
逆則欬而苦頭痛矣若不欬不嘔不厥則頭不痛此證之
頭痛者標也欬逆手足厥者本也

集

程知曰無汗小便利嘔欬肢厥頭痛曷不謂太陽病蓋初
起無頭痛諸表證也此頭痛是二三日後嘔欬而厥所致

非因頭痛致嘔欬而厥也嘔欬二證太陽少陽俱有之其表證未解則屬太陽病其寒熱往來者則謂之少陽病也厥則厥陰有之但無嘔與欬也

張璐曰陽明無汗嘔欬手足厥者得之榮衛俱傷而邪入深也然小便利則邪不在內而在外不在下而在上故知必苦頭痛仍宜小青龍主之若不嘔不欬不厥而小便利者邪必順水道而出豈有逆攻巔頂之理哉

林瀾曰須識陽明亦有手足厥證胃主四肢中虛氣寒所致也然頭苦頭而欬自與陰寒但厥者異矣此類數條最爲難解

吳人駒曰嘔欬手足厥頭痛皆由反無汗之故也

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人咽必痛若不欬者咽不痛

註陽明病當惡熱不惡寒若從傷寒傳來則不能食今從中

風傳來故能食也傷寒挾寒邪則有頭痛證今中風挾風邪則有頭眩證理固然也寒邪屬陰若兼飲則欬而嘔今不嘔而咽痛則以風屬陽邪風病則兼火故欬而咽痛以類相從也

集註方有執曰眩風旋而目運也風故不惡寒能食欬逆氣也

咽門胃之系也胃熱而氣逆攻咽則欬而咽傷也

程知曰陰邪下行故無汗而小便利陽邪上行故不惡寒而頭眩寒則嘔不能食風則能食寒則頭痛風則咽痛是風寒入胃之辨也

程應旄曰陽明以下行為順逆則上行故中寒則有頭痛證中風則有頭眩證以不惡寒而能食知其鬱熱在裏也寒上攻能令欬其欬兼嘔故不能食而手足厥熱上攻亦令欬其欬不嘔故能食而咽痛以胃氣上通於肺而咽爲胃府之門也夫咽痛惟少陰有之今以欬傷致痛若不欬則咽不痛況更有頭眩不惡寒之證益可辨其爲陽明之鬱熱也

病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘

註病人有寒謂胃中寒也復發汗謂汗而復汗也胃寒復汗

陽氣愈微胃中冷甚蚘不能安故必吐蚘也宜理中湯送

烏梅丸可也

集程應旌曰汗生於穀精胃中陽氣所釀也有寒復發汗知

胃陽不復存於內矣蚘何能安

發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止

按必吐下不止之下字當是衍文

註此承上條誤而又誤必變而成逆也胃中虛冷本因誤汗

水藥不得入口入口卽吐而爲逆也若更發其汗則胃逆

益甚不能司納不特水藥入口方吐且必無時而不吐道也

集註

成無已曰汗後水藥不得入口爲之吐逆發汗亡陽胃中

虛冷也若更發汗則愈損陽氣胃氣大虛故吐不止

程應旄曰發汗後見此者由未汗之先其人已是中虛而寒故一誤不堪再誤也

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

註

陽明病脈浮而遲浮主表熱遲主裏寒今其證下利清穀

則爲裏寒太甚法當溫之宜四逆湯主之

集註

汪琥曰陽明經病脈當從長今脈但浮此在表之熱疑也

腑病脈當從數今脈過遲此在裏之寒甚也故見下利清穀其所利之穀食色不變氣不臭即完穀不化也此裏寒已極故與四逆湯也

陽明病欲解時從申至戌上

註

凡陽明病無論在經在府必乘其旺時而解申酉戌陽明旺時也經氣旺則邪氣自退故解也

集註

張志聰曰經云日西而陽氣衰陽明之所主也從申至戌上乃陽明主氣之時表裏之邪欲出必隨旺時而解

音切

奄

音厭

趺

音夫

搏

音國

屎

音豕

摸

音莫

捻

音聶

蘸

莊陰切

擗

音匹

上聲

繞音擾

慣古對切

怵勅律切

疸音旦

痕匣牙切

漱音瘦

車切

藥

音伯

療

郎到切

沸

音蒂

尿

同溺

轉

株戀切

餉

音噎

虬

音回

從纂醫宗金鑑

卷四

御纂醫宗金鑑卷五

訂正仲景全書傷寒論註少陽全篇目錄

小柴胡湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

黃連湯

大柴胡湯

柴胡加芒消湯

在集醫史金鑑

卷五

御纂醫宗金鑑卷五

訂正仲景全書傷寒論註

辨少陽病脈證并治全篇

少陽主春其氣半出地外半在地中人身之氣亦如之故
主半表半裏也半表者謂在外之太陽也半裏者謂在內
之太陰也邪入其間陰陽相移寒熱交作邪正相持進退
互拒此際汗吐下三法俱在所禁故立小柴胡湯和解法
加減施治然小柴胡加減法中又有口不渴身有微熱者
加桂枝以取汗及下後胸脇滿微結小便不利渴而不嘔
頭汗出往來寒熱者用柴胡桂枝乾薑湯汗之又有柴胡

證具而反下之心下滿而鞭痛者此爲結胸也大陷胸湯
主之及柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱
鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之更有本柴胡證醫
以丸藥下之微利胸脇滿而嘔日晡潮熱者小柴胡加芒
消湯下之等法是仲景亦有汗下之法惟在臨證詳察因
病施治不可執一也

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

註

少陽者膽經也其脈起於目銳眥從耳後入耳中挾咽出
頤頤中邪傷其經故口苦咽乾目眩也口苦者熱蒸膽氣
上溢也咽乾者熱耗其津液也目眩者熱薰眼發黑也此

揭中風傷寒邪傳少陽之總綱凡篇中稱少陽中風傷寒者卽具此證之謂也

集註

林瀾曰論中言少陽病胸脇痛耳聾往來寒熱心煩喜嘔胸脇痞鞭半表半裏之證詳矣此何以曰口苦咽乾目眩也大抵病於經絡者此篇諸條已悉之矣若膽熱府自病則又必有此證也

沈明宗曰此雖少陽總證然偏裏矣少陽主膽其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾仲景另出手眼以補口苦咽乾目眩之裏證乃括少陽風傷衛寒傷榮風寒兩傷而言也吳人駒曰少陽者一陽也少陽之上相火主之若從火化

火盛則乾故口苦咽乾也少陽屬木木主肝肝主目故病則目眩也

魏荔彤曰膽府與少陽經爲表裏而非半表半裏之謂半表者對太陽之全表言半裏者對太陰之全裏言故少陽在半表半裏之間總以經絡之界爲言又曰經中所謂不必悉具者指或中餘證而少陽經膽府之主病未有不悉具而遽可指爲少陽病成者

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

註少陽卽首條口苦咽乾目眩之謂也中風謂此少陽病是

從中風之邪傳來也少陽之脈起目銳眦從耳後入耳中其支者會缺盆下胸中循脇表邪傳其經故目赤耳聾胸中滿而煩也然此乃少陽半表半裏之胸滿而煩非太陽證具之邪陷胸滿而煩者比故不可止下若吐下則虛其中神志虛怯則悸而驚也此揭中風邪傳少陽之大綱也

集註

程知曰少陽惟安和解若吐之則虛其陽而悸下之則虛其陰而驚

汪琥曰少陽有吐下之禁祇因煩滿故誤行吐下之法成註謂吐則傷氣氣虛者悸下則亡血血虛者驚不知驚悸皆主於心誤吐且下則津液衰耗神志虛怯故悸而驚也

沈明宗曰胸中煩滿似乎可吐但在少陽其邪已下胸膈脇吐之徒傷胸中之氣使邪內併逼迫神明則悸而驚也魏荔彤曰此條論仲景不出方小柴胡條中心煩心下悸之證想可無事他求也汗吐下三法既不可行則當和解之小柴胡爲少陽對證之藥斯用之宜決耳

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸

註

不曰少陽傷寒而曰傷寒畧言之也謂此少陽病是從傷寒之邪傳來也脈弦細少陽之脈也上條不言脈此言脈者補言之也頭痛發熱無汗傷寒之證也又兼見口苦咽

乾目眩少陽之證故曰屬少陽也蓋少陽之病已屬半裏故不可發汗若發汗則益傷其津而助其熱必發譫語既發譫語則是轉屬胃矣若其人津液素充胃能自和則或可愈否則津乾熱結胃不能和不但譫語且更煩而悸矣此揭傷寒邪傳少陽之大綱也

集註

王肯堂曰凡頭痛發熱俱爲在表惟此頭痛發熱爲少陽者何也以其脈弦細故知邪入少陽之界也

喻昌曰少陽傷寒禁發汗少陽中風禁吐下二義互舉其旨益嚴蓋傷寒之頭痛發熱宐於發汗者尚不可汗則傷風之不可汗更不待言矣傷風之胸滿而煩似可吐下者

尚不可吐下則傷寒之不可吐下更不待言矣。脈弦細者邪欲入裏其在胃之津液已爲熱耗重復發汗而驅其津液外出安得不譫語乎。

王璈曰：誤發其汗譫語者奪其津液而胃乾故言亂也。此少陽之邪已轉屬胃胃和則愈者言當用藥以下胃中之熱而使之和平也。胃不和不但譫語更加煩擾忪悸此言胃熱上犯於心故藏神不自寧也。

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯主之。

註

此承上三條互詳其證以明其治也傷寒中風三四日見口苦咽乾目眩之證與弦細之脈知邪已傳少陽矣若兼見耳聾目赤胸滿而煩者則知是從中風傳來也若兼見頭痛發熱無汗者則知是從傷寒傳來也今五六日更見往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔則知是中風傷寒兼見俱有之證也少陽之邪進可傳太陰之裏退可還太陽之表中處於半表半裏之間其邪外并於表半表不解則作寒內并於裏半裏不和則作熱或表或裏無常故往來寒熱不定也少陽之脈下胸循脇邪奏其經故胸脇苦滿也少陽邪近乎陰故默默也少陽木邪病則妨

土故不欲飲食也邪在胸脇火無從泄上逼於心故心煩也邪欲入裏裏氣外拒故嘔嘔則木氣舒故喜之也此皆柴胡應有之證也其餘諸證時或有之總宜以小柴胡湯主之各隨見證以加減治之可耳然既分中風傷寒之傳而不分其治者何也蓋以太陽有營衛之分故風寒之辨宜嚴及傳陽明少陽則無營衛之分且其邪皆化熱故同歸一致也

集註

成無已曰邪在表裏之間謂之半表半裏傷寒中風者是或傷寒或中風非傷寒再中風中風復傷寒也五六日邪自表傳裏之時邪在表則寒在裏則熱今在半表半裏之

間未有定處故往來寒熱也邪在表心腹不滿邪在裏則
心腹脹滿今言胸脇苦滿亦是在表裏之間也邪在表呻
吟不安邪在裏則內煩經云陽入之陰則靜默默由邪方
自表之裏在表裏之間也邪在表則能食邪在裏不能食
不欲食者未至於必不能食故亦爲在表裏之間也邪在
表則不煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔煩而喜嘔者邪在表
方傳裏也邪初入裏未有定處所傳不一故有或見之證
也

方有執曰五六日大約言也往來寒熱者邪入驅穀之裏
藏府之外兩界之隙地所謂半表半裏乃少陽所主之部

位也故入而併於陰則寒出而併於陽則熱出入無常故
寒熱間作也太陽一經有營衛之不同所以風寒異治陽
明切近太陽營衛之道在邇風寒之辨尚嚴少陽一經越
陽明去太陽遠矣風寒無異治經以傷寒中風五六日往
來寒熱交互爲文者發明風寒至此同歸於一致也

小柴胡湯方

柴胡 半觔

黃芩 三兩

人參 三兩

半夏 半升

甘草 三兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服

一升日三服

加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加枳實一枚

若渴去半夏加人參合前成四兩半枳實根四兩

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩

若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩

若不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩溫服微汗愈

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

方解邪傳太陽陽明日汗曰吐曰下邪傳少陽惟宜和解汗吐

下三法皆在所禁以其邪在半表半裏而角於軀殼之內
界在半表者是客邪爲病也在半裏者是主氣受病也邪
正在兩界之間各無進退而相持故立和解一法旣以柴
胡解少陽在經之表寒黃芩解少陽在府之裏熱猶恐在
裏之太陰正氣一虛在經之少陽邪氣乘之故以薑棗人
參和中而預壯裏氣使裏不受邪而和還表以作解也世
俗不審邪之所據果在半表半裏之間與所以應否和解
之宜及陰陽疑似之辨總以小柴胡爲套劑醫家幸其自
處無過病者喜其藥味平和殊不知因循誤人實爲不淺
故凡治病者當識其未然圖機於早也

集解

程應旄曰方以小柴胡名者取配乎少陽之義也至於制方之旨及加減法則所云上焦得通津液得下胃氣因和盡之矣方中以柴胡疏木使半表之邪得從外宣黃芩清火使半裏之邪得從內徹半夏豁痰飲降裏氣之逆人參補內虛助生發之氣甘草佐柴芩調和內外薑棗佐參夏通達營衛相須相濟使邪不至內向而外解也至若煩而不嘔者火氣燥實逼胸也故去人參半夏加栝蒌實也渴者燥已耗液逼肺也故去半夏加栝蒌根也腹中痛者木氣散入土中胃陽受困故去黃芩以安土加芍藥以戢木也脇下痞鞭者邪既留則木氣實故去大棗之甘而緩加

牡蠣之鹹而與也心下悸小便不利者水邪侵乎心故去黃芩之苦寒加茯苓之淡滲也不渴身有微熱者半表之寒尚滯於肌故去人參加桂枝以解之也欬者半表之寒湊入於肺故去參棗加五味子易生薑爲乾薑以溫之雖肺寒不減黃芩恐乾薑助熱也總之邪在少陽是半表半裏之熱鬱而不升故以小柴胡治之所謂升降浮沉則順之也

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具

註

此承上而言無論傷寒中風邪傳少陽病在半表半裏有柴胡證但見一證便以小柴胡隨證加減治之不必待其

悉具也

集註

方有執曰此承上條辨認少陽一經爲病之大旨

鄭重光曰有柴胡證但見一證便是不必悉具者言往來寒熱是柴胡證此外兼見胸脇滿鞭心煩喜嘔及諸證中凡有一證者卽是半表半裏故曰嘔而發熱者小柴胡湯主之因柴胡爲樞機之劑風寒不全在表未全入裏者皆可用故證不必悉具而方有加減法也至若柴胡有疑似證不可不審者如脇下滿痛本渴而飲水嘔者柴胡不中與也及但欲嘔胸中痛微澹者亦非柴胡證此等又當細爲詳辨者也

傷寒三日少陽脈小者欲已也

註傷寒該中風而言也其邪三日少陽受之脈若大者為邪

盛欲傳今脈小為邪衰欲自已也

集註程應旂曰脈小則陽得陰以和是邪盡退而正來復矣

張錫駒曰三日乃少陽主氣之期脈小則病退也

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡

湯主之

註傷寒四五日邪在三陽之時身熱惡風太陽證也頸項強

太陽陽明證也脇下滿手足溫而渴陽明少陽證也此為

三陽合病之始固當權其孰緩孰急以施其治然其人脇

下滿手足溫而渴是已露去表入裏歸併少陽之機故
從少陽以爲治也主以小柴胡湯者和解其表裏也此三
陽合病不必悉具柴胡證而當用柴胡之一法也

集註

方有執曰三陽俱見病而獨從少陽小柴胡以爲治者太
陽陽明之邪微少陽近裏而裏證見故從少陽一於和而
三善備也

瑜昌曰本當從三陽合併病之例而用表法但手足溫而
加渴是外邪逼湊於少陽向裏之機已著更用辛甘發散
則重增其熱而大耗其津矣故從小柴胡之和法使陽邪
罷而陰津不傷一舉而兩得也小柴胡湯當從加減法不

嘔而渴者去半夏加栝蒌根爲是

張志聰曰手足溫者手足不冷也非病人自覺其溫乃診者按之而得也不然何以旣曰身熱而復云手足溫耶

汪琥曰此條係三陽經齊病而少陽之邪居多也太陽傷寒已至四五日之時不曰發熱惡風祇曰身熱者此太陽之邪漸衰也其兼陽明證不曰鼻乾不得臥而祇曰頸項强者此陽明之邪亦將衰也惟脇下滿爲少陽經之專證况兼手足溫而又渴此爲邪將傳裏之機已著也

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者與小柴胡湯

註陽明病發潮熱當大便鞭小便數也今大便溏小便如常

非陽明入府之潮熱可知矣况有胸脇滿不去之少陽證乎故不從陽明治而從少陽與小柴胡湯主之也

集註

王肯堂曰陽明爲病胃家實也今便澹而言陽明病者謂有陽明外證身熱汗出不惡寒反惡熱也

程應旄曰如得陽明病而發潮熱似乎胃實之徵矣但胃實必大便鞭而小便數今大便澹小便自可是熱非入府之熱也再以胸脇徵之則主以小柴胡湯無疑矣

陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然汗出而解

註

陽明病不大便脇下鞭滿而嘔是陽明傳少陽病也若舌

上黃胎澹者爲陽明之熱未盡則當與大柴胡湯兩解之
今舌上白胎滑者是已傳少陽故可與小柴胡湯和解之
俾上焦得通則嘔可止津液得下則便可通胃氣因和而
鞭滿除則身必濺然汗出而解矣

集註

程知曰此言陽明兼少陽宜用小柴胡也不但大便澹爲

胃未實即使不大便而嘔亦爲邪未入裏鞭滿在脇而不
在腹舌胎白而不黃皆少陽之見證多故當從小柴胡分
解陰陽則上下通和濺然汗出而表裏之邪爲之一徹矣
程應旄曰脇下鞭滿不大便而嘔是大柴胡湯證也其用
小柴胡湯者以舌上白胎猶帶表寒故也若胎不滑而澹

則所謂舌上乾燥而煩欲飲水數升謂裏熱已耗及津液
此湯不可主矣又曰上焦得通照脇下鞭滿言津液得下
照舌胎與嘔言胃氣因和照不大便言上條陽明病從潮
熱上見此條陽明病從不大便上見

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸
而振却發熱汗出而解

註凡柴胡湯病證不與柴胡湯而反下之不變他病柴胡證
仍在者可復與柴胡湯則解但以誤下其證必虛故解必
蒸蒸而熱振振而寒邪正交爭然後汗出而解也

集方有執曰蒸蒸而振作戰汗也必如此而後解者以下後

裏虛故也

程知曰邪氣還表故蒸蒸而熱下後正虛故振振而動

得病六七日衄遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而
脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難者與柴胡湯後必下重
本渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦

按

食穀者噦四字衍文食穀嘔者有之從無噦者

註

得病六七日少陽入太陰之時也衄遲太陰衄也浮弱太
陽衄也惡風寒太陽證也手足溫太陰證也醫不以柴胡
桂枝湯解而和之反二三下之表裏兩失矣今不能食脇
下滿痛雖似少陽之證而實非少陽也而目及身發黃太

陰之證已具也頸項強則陽明之邪未已也小便難者數下奪津之候也此皆由醫之誤下以致表裏雜揉陰陽同病若更以有少陽脇下滿痛之一證不必悉具而又誤與柴胡湯則後必下重是使邪更進於太陰也雖有渴證乃係數下奪津之渴其飲水卽嘔亦非少陽本證之嘔緣誤下所致故柴胡湯不中與也

集註

程知曰前言柴胡證但見一證便是此更言脇下滿痛亦有不宜柴胡者以爲戒也

程應旄曰以一渴證辨之前條之手足溫而渴者熱在裏未經數下自能消水今本渴而飲水則嘔知其渴爲膈燥

津亡之渴數下中虛不能消水究於胃陽無涉然則柴胡湯之於少陽豈可云但見一證便是乎又豈可云下之而柴胡證不罷者復與柴胡湯乎

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

註

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結者是太陽之邪傳少陽也故取桂枝之半以散太陽未盡之邪取柴胡之半以散少陽嘔結之病而不名桂枝柴胡湯者以太陽外證雖未去而病機已見於少陽裏也故以柴胡冠桂枝之上意在解少陽為主而散太陽爲兼也支者側

也小也支結者卽心下側之小結也

集註

方有執曰支節四支骨節也支結言支飲搏聚而結也發熱至微嘔太陽之表也故曰外證未去

程知曰此邪入少陽而太陽證未去者也發熱惡寒支節煩疼太陽證也乃惡寒而微但支節煩痛而不頭項強痛則太陽證亦稍減矣嘔而支結少陽證也乃嘔逆而微但結於心下之偏旁而不結於兩脇之間則少陽亦尚淺也若此者惟當以柴胡湯和解少陽而加以桂枝湯發散太陽此不易之法也

柴胡桂枝湯方

柴胡 四兩

桂枝 一兩半

人參 一兩半

甘草 一兩

半夏 二合半

黃芩 一兩半

芍藥 一兩半

大棗 六枚

生薑 一兩半

右九味以水七升煮取三升去滓溫服一升

集解

柯琴曰仲景書中最重柴桂二方以桂枝解太陽肌表又

可以調諸經之肌表小柴胡解少陽半表亦可以和三陽

之半表故於六經病外獨有桂枝證柴胡證之稱見二方

之任重不拘於經也如陽浮陰弱條是仲景自為桂枝證

之註釋血弱氣盡條是仲景自為柴胡證之註釋桂枝有

壞病柴胡亦有壞病桂枝有疑似證柴胡亦有疑似證如

病似桂枝證脚攣急與胸中痞鞭者及病似柴胡證本渴而飲水嘔與但欲嘔胸中痛者是已此條言傷寒六七日寒熱當退之時反見發熱惡寒諸表證更見心下支結諸裏證表裏不解法當表裏雙解之矣然惡寒微則發熱亦微可知支節煩疼則一身骨節不疼可知微嘔心下亦微結故謂之支結是表證雖不去而已輕裏證雖已見而未甚故取桂枝之半以散太陽未盡之邪取柴胡之半以解少陽微結之證口不渴身有微熱者法當去人參以六七日邪雖未解而正已虛故仍用之外證雖在而病機已見於裏故方以柴胡冠桂枝之上爲雙解兩陽之輕劑也

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此爲未解也柴胡桂枝乾薑湯主之

註

傷寒五六日已發其汗表未解而復下之若邪陷入陽明之裏則必作結胸痞鞭協熱下利等證今邪陷入少陽之裏故令胸脇滿微結也小便不利渴而不嘔者非停水之故乃汗下損其津液也論中有身無汗獨頭汗出發熱不惡寒心煩者乃陽明表熱鬱而不得外越之頭汗也今但頭汗出往來寒熱心煩者無陽明證知爲少陽表熱鬱而不和上蒸之頭汗也此爲少陽表裏未解之證故主柴胡

桂枝乾薑湯以專解半表之邪兼散半裏之結也

集註

林瀾曰五六日已經汗下之後則邪當解今胸脇滿微結

寒熱心煩者是邪猶在半表半裏之間也小便不利而渴乃汗下後亡津液內燥也若有熱飲其人必嘔今渴而不嘔知非飲熱也傷寒汗出則和今但頭汗出餘處無汗者津液不足而未和也與柴胡桂枝乾薑湯以解表裏而復津液也

汪琥曰傷寒頭汗出者乃陽鬱於表非陽虛於上也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡 半觔

桂枝 三兩

乾薑 三兩

栝蒌根

四兩

黃芩

三兩

牡蠣

二兩

甘草

二兩
炙

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

註解

少陽表裏未解故以柴胡桂枝合劑而主之即小柴胡湯之變法也去人參者因其正氣不虛減半夏者以其不嘔恐助燥也加栝蒌根以其能止渴兼生津液也倍柴胡加桂枝以主少陽之表加牡蠣以裏少陽之結乾薑佐桂枝以散往來之寒黃芩佐柴胡以除往來之熱且可制乾薑不益心煩也諸藥寒溫不一必需甘草以和之初服微煩

藥力未及復服汗出卽愈者可知此證非汗出不解也

服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之

註

風寒之邪從陽明而傳少陽起初不渴今服柴胡湯已反渴者是少陽轉屬陽明也以法治之謂當分其經府見證而治之也葛根白虎調胃開各從其安而用之可耳

集註

方有執曰已畢也服柴胡湯已畢而渴則非暫渴其爲熱已入胃亡津液而渴可知故曰屬陽明也

沈明宗曰服柴胡湯已渴者乃少陽之邪不傳三陰而轉入陽明矣卽當隨陽明現證而治故謂以法治之

鄭重光曰少陽陽明之病機在嘔渴中分渴則轉屬陽明

嘔則仍在少陽如嘔多雖有陽明證不可攻之因病未離少陽也服柴胡湯渴當止若服柴胡湯已加渴者是熱入胃府耗津消水此屬陽明胃病也

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便秘
脈細者此爲陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出爲
陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在
外也脈雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗
出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

按
脈細當是脈沉細觀本條下文脈沉亦在裏也之亦字自
知脈雖沉緊之緊字當是細字本條上文並無緊字如何

說衾雖沉緊雖字何所謂耶必是傳寫之誤

註

傷寒五六日雖表有頭汗出微惡寒之陽邪未罷裏有心下滿口不欲食大便鞭之陽結已形但手足冷衾沉細則陽邪所結殊微也故曰此爲陽微結必有表復有裏也然衾沉細似乎裏陰盛而頭汗出則爲表陽鬱也假令純陰結則不得復有頭汗出之外證始合悉入在裏之純陰結矣夫旣非悉入在裏之純陰結此必爲半在裏半在表之陽微結也故衾雖沉細不得爲少陰病所以然者三陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯者和其不通身汗出微惡寒也設不了了者必大便之鞭未除自

宜利其大便使得屎而解也

集註

喻昌曰陽微結者陽邪微結未盡散也舊註作陽氣衰微

故邪氣結聚大差果爾則頭汗出爲亡陽之證非半表半裏之證矣果爾則陰結又是陰氣衰微矣玩本文假令純陰結及陽邪若不微結是純陰邪內結則不得復有外證等語其義甚明

程知曰此言少陽病有似少陰者當細辨其脈證也

程應旂曰凡脈細脈沉皆陰脈也今與陽證同見則爲陽熱鬱結之診無關少陰也可見陽氣一經鬱結不但陽證似陰並陽脈亦似陰矣

沈明宗曰得屎而解當用大柴胡之法也

吳人駒曰此證嘗見有誤作陰寒而施溫熱以致大逆者
蓋因其惡寒手足冷脈細而沉不究其證之始末由來也
周揚俊曰此條惡寒肢冷不欲食脈細或沉有似乎陰最
難辨晰仲景特出陽微結三字昭示千古以頭汗出爲陽
陰不得有汗也至五六日頭痛發熱證原屬陽也故縱見
少陰之脈不得爲少陰之病然獨未見少陽一證何遽得
爲少陽病耶此仲景所以又明言半在表半在裏也爾時
裏證旣多不得純以表藥汗之外證似陰不得復以裏藥
溫之故取小柴胡提出其邪於表裏之半而大便秘不了

了者則當下之得屎無疑也仲景恐人未明白爲詳辨然
後知手足冷微惡寒者正因陽邪鬱結不外通於肢體故
獨頭汗出也

傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者
與小柴胡湯主之

註傷寒脈得浮濇營衛不足也脈得沉弦木入土中也營衛

不足則表虛木入土中則裏急惟表虛裏急腹中急痛所
以先用小建中湯以其能補營衛兼緩中急則痛可差也
或不差必邪尚滯於表知濇爲營衛不通弦爲少陽本脈
故與小柴胡湯按法施治也成無已去黃芩加芍藥疏外

調中其說亦是

集註汪琥曰弦脈不除痛猶未止者爲不差此爲少陽經有留

邪也

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

註

傷寒未解欲嘔吐者胸中有熱邪上逆也腹中痛者胃中有寒邪內攻也此熱邪在胸寒邪在胃陰陽之氣不和失其升降之常故用黃連湯寒溫互用甘苦並施以調理陰陽而和解之也然此屬外因上下寒熱之邪故有如是之證若內因雜病嘔吐而腹痛者多因宿食由此推之外因內因證同而情異概可知矣

行身學金卷五

集註程知曰陰邪在腹則陽不得入而和陰為腹痛陽邪在上

則陰不得入而和陽為欲嘔逆

汪琥曰尚論篇皆以風寒二邪分陰陽寒熱殊不知風之初來未必非寒寒之既入亦能化熱不可拘也

鄭重光曰此熱邪中於上焦寒邪中於下焦陰陽不相入失其上下升降之常也

黃連湯方

黃連 三兩

甘草 三兩

乾薑 三兩

人參 二兩

桂枝 三兩

半夏 半升

大棗 十二枚

擘

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服晝三夜二

方解

傷寒邪氣入裏因人藏氣素有之寒熱而化病如陽明病
鞭滿不大便而嘔舌上白胎者以小柴胡湯及太陽病下
之裏虛懊懷舌上如胎者以梔子鼓湯之類是隨胸中有
寒丹田有熱化者也此則隨胃中有寒胸中有熱而化腹
中痛欲嘔吐故以是方主之君黃連以清胃中之熱臣乾
薑以溫胃中之寒半夏降逆佐黃連嘔吐可止人參補中
佐乾薑腹痛可除桂枝所以安外大棗所以培中也然此
湯寒溫不一甘苦並投故必加甘草協和諸藥此爲陰陽
相格寒熱並施之治法也

太陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯

註

太陽病十日以上無他證脈浮細而嗜臥者外邪已解不

須藥也設有胸滿脇痛等證則知少陽之外邪未解故與小柴胡湯和之若脈但浮不細而有頭痛發熱惡寒無汗等證則仍是太陽之外邪未解當與麻黃湯汗之

按

論中脈浮細太陽少陽脈也脈弦細少陽脈也脈沉細少陰脈也脈浮細身熱嗜臥者陽也脈沉細身無熱嗜臥者陰也脈緩細身和身和嗜臥者已解也是皆不可不察也

集註

王肯堂曰此條當是太陽少陽合病胸滿雖同而脈浮細

嗜臥則爲表邪已解脇痛爲少陽有邪故與小柴胡湯若
脈但浮者又當先治太陽也故與麻黃湯此是設爲變通
之言非爲服柴胡而脈浮也

傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之

按

下利之下字當是不字若是下字豈有上吐下利而以大

柴胡湯下之之理乎

註

傷寒發熱汗出不解表尙未已也心中痞鞭大便不利裏
病又急矣嘔吐少陽陽明兼有之證也少陽陽明兩急心
中熱結成痞故以大柴胡湯外解少陽發熱未盡之表內
攻陽明成實痞鞭之裏也

按

太陽病發熱汗出不解心下痞鞭下利不嘔吐者此表裏俱虛桂枝人參湯證也若嘔吐不利者此表裏俱實大柴胡湯證也彼則脈微弱此則脈必有力也

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之則愈

註

太陽病傳過三陽之經十餘日醫不隨經施治反二三下之未致變逆後四五日惟見少陽寒熱往來之柴胡證仍在者宜先與小柴胡湯解表和裏如或不愈其嘔不止心下滿急鬱鬱微煩此爲少陽表裏均未解也與大柴胡湯

下之攻裏和表自可愈也

集註

方有執曰過經與壞病同不知何逆而二三下之適所以致逆故曰反也下而又下陽明雖未傷而少陽亦未除故曰柴胡證仍在也嘔不止鬱鬱微煩乃邪擾二陽故曰未解也

程知曰此言過經誤下有用大小柴胡兩解法也蓋其人之邪因屢下而深入若表證未罷必先用小柴胡和其牛表而後可兼攻其裏也

程應旌曰此條與陽明經嘔多雖有陽明證不可下之條細細酌量陽明證嘔在上而邪亦在膈之上未入府故不

可下此條嘔不止心下急乃邪在膈之下已屬胃乃可下
也可下不可下此等處最不容誤也

林瀾曰嘔不止則半表裏證猶在然心下急鬱鬱微煩必
中有燥屎也非下除之不可故以大柴胡兼而行之

大柴胡湯方

柴胡 半觔

黃芩 三兩

半夏 半升

芍藥 三兩

枳實 四枚

大黃 二兩

生薑 五兩

大棗 十二枚

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日

三服

按

許叔微曰大柴胡湯一方無大黃一方有大黃此方用大黃者以大黃有蕩滌蘊熱之功爲傷寒中要藥王叔和云若不用大黃恐不名大柴胡湯且經文明言下之則愈若無大黃將何以下心下之急乎應從叔微爲是

解方

柴胡證在又復有裏故立少陽兩解之法以小柴胡湯加枳實芍藥者解其外以和其內也去參草者以裏不虛也少加大黃所以瀉結熱也倍生薑者因嘔不止也

太陽病過經十餘日心中溫溫欲吐而胸中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微澹者此非柴胡證以嘔故知極吐下也

按

王肯堂曰溫溫當是嘔嘔又云以嘔之下當有闕文

註

太陽病過經十餘日曾經吐下不解者以極吐則虛其

邪熱乘虛入胸故心下嘔嘔欲吐而胸中痛也極下則虛其裏邪熱乘虛入裏故大便秘澀腹微滿鬱鬱微煩也詢知先時若果經極吐下則爲在表之邪熱悉陷胸腹而所見者皆是裏證未和故宜與調胃承氣湯下而和之若不爾者謂不因極吐極下而有斯證則又不可與是湯也夫但欲嘔者少陽也胸中痛者太陽也微澀者太陽少陽合病之利也並無心中嘔嘔鬱鬱腹滿煩熱等證固不可與承氣湯矣然此亦非柴胡證故柴胡湯亦不可與也須從

太陽少陽合病下利若嘔者與黃芩加半夏生薑湯可也

集註

方有執曰胸中痛邪在膈也若曾經吐則應有心下噎噎

欲吐之狀何也以胃口已被吐傷邪熱上搏於膈故欲吐而不得吐也腹微滿鬱鬱微煩邪在胃也若曾經下則應大便微溏何也以下則胃虛邪雖實於胃大便反不能結鞭也故曰先此時自極吐下者與調胃承氣湯言當蕩其熱以和其胃也不爾言未經極吐下也但欲嘔至未申明上文之意

喻昌曰太陽病過經十餘日心下噎噎欲吐而不吐其人胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩者此有二辨若曾經

大吐大下者表邪從吐解且已入裏可用調胃承氣之法
若未經極吐下但欲嘔不嘔胸中痛微澹者是痛非吐所
傷澹非下所致調胃之法不可用矣

程知曰過經者謂病過七八日至十三日經氣已週猶不
解也豈惟十三日且有二十餘日者矣蓋過經不解病必
皆在陽經留連若在陰經則又豈能若是之持久耶久持
且不能安望其生乎

程應旄曰大便澹則氣得下洩腹不應滿煩不應鬱鬱今
仍腹微滿鬱鬱微煩必胃有阻留而下後仍不快暢也病
屬陽明證反無陽明而祇有少陽其中必有所誤故直窮

其所以致證之由而後可從證上認病

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之

註

凡傷寒過經不解熱邪轉屬胃府者多皆當下之今傷寒十三日不解過經胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本大柴胡證也下之而不通利今反利者詢知爲醫以丸藥迅下之非其治也迅下則水雖去而燥者仍存恐醫以下後之利爲虛故復指曰潮熱者實也是可再下者也但胸脇之邪未已故先宜小柴胡湯以解少陽之外復以

小柴胡湯加芩消以下少陽之裏不用大黃而加芩消者
因裏不急且經迅下惟欲其裏堅潤燥耳是又下中兼和
之意也

集註

內臺方議曰潮熱者實也何不用大柴胡大小承氣下之
却用芩消何也蓋潮熱雖屬實然已先用丸藥傷動藏府
若再用大黃下之則脾氣傷而成壞證矣祇用芩消潤燥
以取利也

方有執曰十三日過經也不解壞證也非其治也以上乃
原其壞由於醫之誤以下至未救誤之治也

柴胡加芩消湯方

於小柴胡湯方內加芒消六兩餘依前法服不解更服
傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此爲內實也調胃承氣湯主之

註此承上條互發其義以詳其治也傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以湯藥下其熱但上條潮熱之熱熱在表裏當大便不鞭此條譫語之熱熱歸胃府法當大便鞭若小便利者大便當鞭今大便不鞭而反下利脈調和者知爲醫以丸藥下之之利非其治也如未經丸藥下之

自下利者則爲內虛內虛之利脈當微弱而厥今反和而
不微厥此爲內實有熱非內虛有寒也雖下利乃熱利也
仍當下其熱故以調胃承氣湯主之

傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三
陰不受邪也

註

傷寒之邪一日太陽受之二日陽明受之三日少陽受之

四日太陰受之五日少陰受之六日厥陰受之此傳經之
次第也今傷寒三日三陽表邪爲盡三陰當受邪其人當
不能食而嘔今反能食而不嘔者此爲裏和三陰不受邪
也然此乃內經以其大概而言究不可以日數拘也

集註

成無已曰表邪傳裏裏不和則不能食而嘔今反能食而

不嘔是邪不傳陰但在陽也

方有執曰陽以表言陰以裏言能食不嘔裏氣和而胃氣
回陰不受邪可知矣

汪琥曰邪在少陽原嘔不能食今反能食而不嘔可徵裏
氣之和而少陽之邪自解也裏既和而少陽之邪解則其
不傳三陰斷斷可必故云三陰不受邪也

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此爲陽去入陰故也

註

傷寒六七日邪欲入裏之時也無大熱表熱微也躁煩者
裏熱盛也此爲陽去入陰也陽去入陰者謂陽邪去表入

裏傳於三陰也

集註

成無已曰內熱爲煩謂心中鬱煩也外熱爲燥謂身外熱躁也內熱爲有根之火故但煩不燥及先煩後躁者皆可治外熱爲無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不可治

方有執曰去往也言表邪去而入於裏所以外無他熱而內則煩躁也

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀讖語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

註婦人中風發熱惡寒表病也若經水不來熱必無由傳於血室今經水適來得之七八日後脈遲熱除身涼似乎表欲解矣若復見胸脇下滿如結胸狀識語之證則知非表解入裏乃表邪之熱因經水適來乘虛而入於血室也法當刺期門期門爲肝之穴肝爲藏血之所今邪入血室故刺期門隨其血分實熱而瀉之也

集註

方有執曰血室爲營血停留之所經血集會之處卽衝脈所謂血海是也其脈起於氣衝並少陰之經夾臍上行至胸中而散故熱入而病作其證則如是也期門二穴在不容兩傍各去同身寸之一寸五分肝之募之肝納血故刺

期門所以瀉血分之實熱也

汪琥曰邪傳少陽熱入血室故作譫語等證仲景恐人誤
認為陽明府實證輕用三承氣以伐胃氣故特出一刺期
門法以療之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入
血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

註

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為
熱入血室血與熱搏其血必結然雖結而無胸脇滿如結
胸譫語等證是為結而未實也倘有如瘧狀之寒熱發作
有時乃為邪在少陽半表半裏也故用小柴胡湯以和表

裏熱自解也

集註

方有執曰前經水適來者因熱入血室血出而熱遂遺也此適斷者熱乘血來而遂入之與後血相搏俱留而不出故曰其血必結也

程知曰前證經水來而胸脇滿結譫語是邪實於藏也故用刺以瀉之此證因血結而寒熱如瘧是邪發於經也故用小柴胡湯和之

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

註

上二條發明風邪熱入血室之證此條發明寒邪熱入血

室之證婦人傷寒發熱無汗經水適來則必熱入血室故
晝則明了知邪不在陽也暮則譫語如見鬼狀者是爲邪
在陰也無犯胃氣及上二焦者通謂三焦也蓋禁人汗吐
下三法皆不可輕用當俟其經行必熱隨血去而愈也

集註

方有執曰必自愈者言俟其經行血下則邪熱得以隨血
而俱出猶之鼻衄紅汗故自愈也蓋警人勿妄攻以致變
亂之意

林瀾曰傷寒發熱者寒已成熱也經水適來則血室空虛
邪熱乘虛入於血室若晝日譫語爲邪客於府與陽爭也
此晝日明了暮則譫語如見鬼狀者是邪不入府而入於

血室與陰爭也陽盛譫語妄下此不可下者犯胃氣也彼
熱入血結寒熱者與小柴胡湯散邪發汗此雖熱入血室
而不留結不可與發汗藥犯其上焦也若熱入胸脇滿如
結胸者可刺期門此雖熱入血室而無滿結不可刺期門
以犯其中焦也必自愈者以經行則熱隨血去血下則邪
熱悉除而愈矣

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭
往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高
痛下故使嘔也

一云藏府相連其病必下脇膈中痛

小柴胡湯主之

註此詳申上三條婦人中風傷寒經水適來過多以致血弱

氣盡腠理不密邪熱之氣乘虛入於血室邪與正相搏結於少陽之界故邪結於脇下也邪正相爭爭於陽則熱爭於陰則寒故往來寒熱也爭已必衰衰則止故休作有時也少陽病已入半裏將近厥陰故默默不欲飲食也少陽膽與厥陰肝相爲表裏故曰藏府相連也少陽之脈下胸中循脇表厥陰之脈抵少腹循脇裏故其痛必及於脇下也少陽之邪從胸而下脇因胸而病及於脇故曰邪高痛下也邪從胸循脇入裏裏氣上拒故使嘔也仲景重出此條仍主之以小柴胡湯者使知法不外少陽不必另從厥陰血室中求治也

註喻昌曰四條皆互文見意也一云經水適來一云經水適
斷一云七八日熱除而脈遲身涼一云七八日續得寒熱
發作有時一云胸脇下滿一云邪氣因入與正氣相搏結
於脇下一云如結胸狀一云邪高痛下一云譫語一云晝
日明了暮則譫語如見鬼狀一云如瘧狀一云往來寒熱
休作有時一云刺期門一云用小柴胡湯一云毋犯胃氣
及上二焦皆互文以明大意而自爲註脚也學者試因此
而細繹全書思過半矣如結胸狀四字仲景尚恐形容不
盡重以藏府相連邪高痛下之語暢發病情蓋血室者衝
脈也下居腹內厥陰肝之所主也而少陽之膽與肝相連

府邪在上藏邪在下胃口逼處二邪之界所以默默不欲飲食而但喜嘔耳期門者肝之募也隨其實而瀉之瀉肝之實也又刺期門之註脚也小柴胡湯治少陽之正法也毋犯胃氣及上二焦則舍期門小柴胡湯更無他法矣

嘔而發熱者小柴胡湯主之

衍文已見太陽中篇
半夏瀉心湯條上

少陽病欲解

時從寅至辰上

註

寅卯辰木旺之時也經云陽中之少陽通於春氣故少陽之病每乘氣旺之時而解經氣之復理固然也

集註

魏荔彤曰病在少陽乘其正旺如法治之何病不已

音切

少 去聲
濇 音色
嘔 乙骨
切 腠 音湊

名集醫部全錄

卷五

三

御纂醫宗金鑑卷六

訂正仲景全書傷寒論註太陰全篇目錄

理中丸

乾薑黃連黃芩人參湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

御覽圖分金鑑

卷六

御纂醫宗金鑑卷六

訂正仲景全書傷寒論註

辨太陰病脈證并治全篇

六氣之邪感入雖同人受之而生病各異者何也蓋以人之形有厚薄氣有盛衰藏有寒熱所受之邪每從其人之藏氣而化故生病各異也是以或從虛化或從實化或從寒化或從熱化譬諸水火水盛則火滅火盛則水耗物盛從化理固然也誠知乎此又何疑乎陽邪傳陰變寒化熱而遂以爲奇耶自後漢迄今千載以來皆謂三陰寒邪不傳且以傷寒傳經陰邪謂爲直中抑知直中乃中寒之證

非傳經之邪耶是皆未曾熟讀仲景之書故有此悞耳如
論中下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏
宜四逆湯攻表宜桂枝湯此三陽陽邪傳入太陰邪從陰
化之寒證也如少陰病下利白通湯主之此太陰寒邪傳
少陰之寒證也如下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈
四逆湯主之此少陰寒邪傳厥陰之寒證也皆歷歷可據
豈得謂傷寒陰不相傳無陽從陰化之理乎夫太陰濕土
純陰之藏也故病一入太陰則邪從陰化者多從陽化者
少從陰化者如論中腹滿吐食自利不渴手足自溫時腹
自痛宜服理中四逆輩者是也從陽化者如論中發汗後

不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯腹滿大實痛者宜桂
枝加大黃湯主之者是也蓋脾與胃同處腹中故腹滿腹
痛兩皆有之然腹滿爲太陰主病心下滿爲陽明主病其
陽明亦有腹滿者以陽明腹滿與熱同化故必有潮熱自
汗不大便之證而不似太陰與濕同化有發黃暴煩下利
穢腐之證也誠能更於腹之時痛大實痛腹滿痛處詳審
虛實斟酌溫下則了無餘義矣故以此括之自知太陰之
要法也

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必
胸下結鞭

按

吳人駒曰自利益甚四字當在必胸下結鞭句之下其說甚是若在吐食不下句之下則是已吐食不下而自利益甚矣仲景復曰若下之無所謂也

註

太陰脾經也其脈布胃中絡於噤寒邪傳於太陰故腹滿時腹自痛寒邪循脈犯胃故吐食不下此太陰裏虛邪從寒化之證也當以理中四逆輩溫之若腹滿噤乾不大便大實痛始爲太陰裏實邪從熱化之證當以桂枝加大黃湯下之矣若以太陰虛寒之滿痛而誤認爲太陰實熱之滿痛而下之則寒虛相搏必變爲藏結痞鞭及自利益甚矣此太陰病全篇之提綱後凡稱太陰病者皆指此證而

言也

集註程應旂曰陽邪亦有腹滿得吐則滿去而食可下者今腹滿而吐食不下則滿爲寒脹吐爲寒格也陽邪亦有下利腹痛得利則痛隨利減者今下利而時腹自痛則利爲寒利痛爲寒痛也曰胸下陰邪結於胸下之陰分異於陽邪結胸之在胸且按之而痛也曰結鞭無陽以化氣則爲堅陰異於痞之濡而與也彼皆陽從上陷而阻留此則陰從下逆而不歸寒熱大別也

吳人駒曰自利有時而腹自痛非若積蓄而常痛者若以諸痛爲實從而下之其滿益甚必令胸下皆爲結鞭而自

利益甚矣

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也

註傷寒四五日邪入太陰之時也腹中痛若不轉氣下趨者

屬陽明也今腹中痛轉氣下趨少腹者乃太陰欲作自利

之候也此仲景示人不可以諸痛爲實而妄議下之意也

集方有執曰腹中痛轉氣下趨者裏虛不能守而寒邪下迫

也

張璐曰腹痛亦有屬火者其痛必自下而上攻若痛自土而下趨者定屬寒痛無疑矣

魏荔彤曰此重在預防下利而非辨寒熱也玩若字欲字

可見其辨寒邪者自有別法

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩

註

凡自利而渴者裏有熱屬陽也若自利不渴則爲裏有寒屬陰也今自利不渴知爲太陰本藏有寒也故當溫之四逆輩者指四逆理中附子等湯而言也

集註

程知曰言太陰自利爲寒宜溫者也少陰屬腎水熱入而耗其水故自利而渴太陰屬脾土寒入而從其濕則不渴而利故太陰自利當溫也

程應旆曰三陰同屬藏寒少陰厥陰有渴證太陰獨無渴證者以其寒在中焦總與龍雷之火無涉少陰中有龍火

底寒甚則龍升故自利而渴厥陰中有雷火故有消渴太
陽一照雷雨收聲故發熱則利止見厥而復利也

魏荔彤曰自利二字乃未經誤下誤汗誤吐而成者故知
其藏本有寒也

理中圓方

人參

白朮

甘草

炙

乾薑

各三兩

右四味擣篩蜜和爲丸如雞子黃許大以沸湯數合和一
丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然
不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮取三升去滓

溫服一升日三服

加減法

若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩

吐多者去朮加生薑三兩

下多者還用朮悸者加茯苓二兩

渴欲得水者加朮足前成四兩半

腹中痛者加人參足前成四兩半

寒者用乾薑足前成四兩半

腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升訖

微汗勿發揭衣被

解集

程應旄曰陽之動始於溫溫氣得而穀精運穀氣升而中
氣曉故名曰理中實以燮理之功予中焦之陽也蓋謂陽
虛卽中氣失守臍中無發宣之用六府無灑陳之功猶如
釜薪失焰故下至清穀上失滋味五藏凌奪諸證所由來
也參朮炙草所以守中州乾薑辛以溫中必假之以燃釜
薪而騰陽氣是以穀入於陰長氣於陽上輸華蓋下攝州
都五藏六府皆受氣矣此理中之旨也若水寒互勝卽當
脾腎雙溫加之以附子則命門益而土母溫矣白朮補脾
得人參則壅氣故臍下動氣吐多腹滿皆去朮也加桂以
伐腎邪加生薑以止嘔也加附子以消陰也下多者濕勝

也是用未煖也渴欲飲水飲渴也加朮使飲水生津也

也還用木燥濕也渴欲飲水飲溺也加木使飲化津生也
心下悸停水也加茯苓導水也腹中痛倍人參虛痛也寒
者加乾薑寒甚也

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口卽吐乾
薑黃連黃芩人參湯主之

按

經論中並無寒下之病亦無寒下之文玩本條下文寒格
更逆吐下可知寒下之下字當是格字文義始相屬註家
皆釋胃寒下利不但文義不屬且與芩連之藥不合

註

經曰格則吐逆格者吐逆之病名也朝食暮吐脾寒格也
食入卽吐胃熱格也本自寒格謂其人本自有朝食暮吐

寒格之病也今病傷寒醫見可吐可下之證遂執成法復行吐下是寒格更逆於吐下也當以理中湯溫其太陰加丁香降其寒逆可也若食入口即吐則非寒格乃熱格也當用乾薑人參安胃黃連黃芩降胃火也

乾薑黃連黃芩人參湯方

乾薑

黃連

黃芩

人參

各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

詳傷寒醫不分表裏寒熱虛實而誤下之續得下利清穀不止者實其裏也雖有通身疼痛之表未除但下利清穀不止裏寒已盛法當急救其裏俟便利自調仍身疼痛不止再救其表可也救裏宜四逆湯溫中勝寒救表宜桂枝湯調營和衛也

集註

王三陽曰此證當照顧協熱利須審其利之色何如與勢之緩急不可輕投四逆桂枝也

喻昌曰攻裏必須先表後裏始無倒行逆施之患惟在裏之陰寒極盛不得不急救其裏俟裏證稍定仍救其表蓋謂救裏後再行救表也

下利清穀不可攻表汗出必脹滿

註此詳上條不先救裏而發其表以明太陰少陰同病之證也下利清穀太陰寒邪已傳少陰卽有身痛不可攻表若誤攻其表卽使汗出太陽表解而太陰寒凝必脹滿矣

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

註

此承上條互發其證以明先裏後表之治也下利腹脹滿者裏寒邪也身體疼痛者表寒邪也凡表裏寒邪之證同見總以溫裏爲急故當先溫其裏後攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

註方有執曰裏虛表實惟其虛也故必先之惟其實也故可

後焉

發汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘草人參湯主之

註

發汗後表已解而腹滿者太陰裏虛之脹滿也故以厚朴生薑甘草半夏人參湯主之消脹散滿補中降逆也

集註

成無已曰吐後脹滿與下後脹滿皆為實者言邪氣乘虛入裏而為實也發汗後則外已解腹脹滿知非裏實由太陰不足脾氣不通故壅而為滿也與此湯和脾胃而降逆氣安矣

汪琥曰此條乃汗後氣虛腹脹滿其人雖作脹滿而內無

實形所以用人參炙甘草等甘溫補藥無疑也

張錫駒曰此言發汗而傷其脾氣也脾主腹故腹滿為太陰主病發汗後而腹脹滿則知其人脾氣素虛今脾氣愈虛則不能轉輸濁氣不降清氣不升而脹滿作矣

厚朴生薑半夏甘草人參湯方

厚朴

半觔炙去皮

生薑

半觔切

半夏

半升洗

甘草

二兩炙

人參

一兩

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯
當下之宜大承氣湯

此詳申上條互發其義以別其治也發汗後表已解腹滿
不痛者乃腹滿時減減復如故之虛滿也當溫之厚朴生
薑半夏甘草人參湯證也今發汗後表不解腹滿大痛者
乃腹滿不減減不足言之實滿也當下之宜大承氣湯蓋
以裏急先攻裏後和表也

集註

喻昌曰減不足言四字形容腹滿如繪見滿至十分卽減
去一二分不足殺其勢也此所以縱有外邪未解而當下
無疑矣

程應旼曰下之而腹滿如故卽減去一二分算不得減下
之不妨再下必當以減盡爲度也

劉宏璧曰太陰無可下之法也設在經則各經已無可下之理在藏則太陰尤無受下之處桂枝加大黃湯安能無疑乎不知脾與胃相表裏也太陽悞下太陰受邪適胃有宿食則脾因胃之實而實亦卽因太陽之邪而痛矣旣大滿大痛已成胃實又非此湯之所能治故宜太承氣湯也太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

註

太陰經病脈當浮緩太陰藏病脈當沉緩今邪至太陰脈浮不緩者知太陽表邪猶未全罷也故卽有吐利不食腹滿時痛一二證其脈不沉而浮便可以桂枝發汗先解其外俟外解已再調其內可也於此又可知論中身痛腹滿

下利急先救裏者蠟必不浮矣

集註

王肯堂曰病在太陽蠟浮無汗宜麻黃湯此蠟浮當亦無汗而不言者謂陰不得有汗不必言也不用麻黃湯而用桂枝湯蓋以三陰兼表病者俱不當大發汗也須識無汗亦有用桂枝者

程知曰此言太陰宜散者也太陰病謂有腹痛下利證也太陽蠟尺寸俱浮今蠟浮則邪還於表可知矣故宜用桂枝解散不用麻黃者陰病不得大發其汗也桂枝湯有和裏之意焉

程應旂曰此太陰中之太陽也雖有裏病仍從太陽表治

方不引邪入藏

本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之

註

本太陽中風病醫不以桂枝湯發之而反下之因而邪陷入裏餘無他證惟腹滿時痛者此屬太陰裏虛痛也故宜桂枝加芍藥湯以外解太陽之表而內調太陰之裏虛也若大滿實痛則屬太陰熱化胃實痛也故宜桂枝加大黃湯以外解太陽之表而內攻太陰之裏實也

集註

趙嗣真曰太陰腹滿證有三有次第傳經之邪有直入中寒之邪有下後內陷之邪不可不辨

喻昌曰太陽病之誤下其變皆在胸脇以上此之誤下而
腹滿時痛無胸脇等證則其邪已入陰位所以屬在太陰
也仍用桂枝解肌之法以升發太陽之邪倍芍藥者以調
太陰之氣本方不增一藥斯爲神耳大實大滿宜從急下
然陽分之邪初陷太陰未可峻攻但於桂枝湯中少加太
黃七表三裏以分殺其邪與大柴胡湯同其義也

程應旂曰誤下太陽而成腹滿時痛太陰之證見矣然表
邪內陷留滯於太陰非藏寒病也仍用桂枝湯升發陽邪
但倍芍藥以調和之倘大實而痛於證似可急下然陰實
而非陽實仍從桂枝例升發陽邪但加大黃以破結滯之

物使表裏兩邪各有去路則寒隨實去不溫而自溫矣然

此二證雖屬之太陰實從太陽傳來則脈必尙浮可知

桂枝加芍藥湯方

於桂枝湯方內更加芍藥三兩隨前共六兩餘依桂枝湯法

桂枝加大黃湯方

桂枝 三兩

大黃 二兩

芍藥 六兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

集解柯琴曰腹滿為太陰陽明俱有之證然位同而職異太陰

主出太陰病則腐穢氣凝不利故滿而時痛陽明主內陽

明病則腐穢燥結不行故大實而痛是知大實痛是陽明
病而非太陰病矣仲景因表證未解陽邪已陷入太陰故
倍芍藥以益脾調中而除腹滿之時痛此用陰和陽法也
若表邪未解而陽邪陷入陽明則加大黃以潤胃通結而
除其大實之痛此雙解表裏法也凡妄下必傷胃之氣液
胃氣虛則陽邪襲陰故轉屬太陰胃液潤則兩陽相搏故
轉屬陽明屬大陰則腹滿時痛而不實陰道虛也屬陽明
則腹滿大實而痛陽道實也滿而時痛是下利之兆大實
而痛是燥屎之徵故倍加芍藥小變建中之劑少加大黃
微示調胃之方也

太陰爲病脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之
其人胃氣弱易動故也

註

太陰爲病必腹滿而痛治之之法當以脈消息之若其人
脈弱則其中不實雖不轉氣下趨少腹然必續自便利設
當行大黃芍藥者宜減之以胃氣弱難堪峻攻其便易動
故也由此推之可知大便秘者不論在陰在陽凡脈弱皆
不可輕下也

集註

程知曰此言太陰脈弱恐續自利雖有腹痛不宜用攻與
建中湯相發明也

喻昌曰此段叮嚀與陽明篇中互相發明陽明曰不轉夫

氣曰先鞭後漚曰未定成鞭皆是恐傷太陰脾氣此太陰證而脈弱恐續自利雖有腹痛減用太黃芍藥又是恐傷陽明胃氣也

汪琥曰或問大黃能傷胃氣故宜減芍藥能調脾陰何以亦減之答曰脈弱則氣餒不充仲景以溫甘之藥能生氣芍藥之味酸寒雖不若大黃之峻要非氣弱者所宜多用故亦減之

傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

註

傷寒脈浮而緩手足熱者爲繫在太陽今手足溫故知繫在太陰也太陰屬濕濕與熱瘀當發身黃小便自利者則濕不蓄熱不瘀故不能發黃也若至七八日大便鞭則爲轉屬陽明今既不鞭雖暴煩下利日十餘行必當自止何也以脈浮緩手足溫知太陰脾家素實邪不自容腐穢當去故也

集註

程知曰言自利之證脈浮緩手足溫則爲脾實也太陰脈本緩故浮緩雖類太陽中風而手足自溫則不似太陽之發熱更不似少陰厥陰之厥逆所以爲繫在太陰也太陰濕熱相蒸勢必發黃然小便利則濕下泄而不發黃矣此

雖暴煩利有似少陰之證然其利當自止所以然者以
脈浮緩手足溫知其入脾氣實而非虛寒之比其濕熱所
積之腐穢自當逐之而下也若不辨晰而以四逆法治之
則誤矣

程應旆曰太陰得浮緩手足溫之脈證則胃陽用事自無
藏寒之痛陰鬱或有之小便不利必發黃雖發黃不爲陰
黃若小便自利者不能發黃陰欲鬱而陽必驅至七八日
雖暴煩下利日十餘行必自止所以然者脈不沉且弱而
浮緩手足不涼而自溫陰得陽以周護則不寒不寒則不
虛是爲脾家實也經曰陽道實陰道虛陰行陽道豈肯容

邪久住此則腐穢當去故耳

汪琥曰下利煩燥者死此爲先利而後煩是正氣脫而邪氣擾也茲則先煩後利是脾家之正氣實故不受邪而與之爭因暴發煩熱也

太陰中風四肢煩痛陽微陰濇而長者爲欲愈

計太陰中風者謂此太陰病是從太陽中風傳來者故有四肢煩疼之證也陰陽以浮沉言夫以浮微沉濇之太陰脈而兼見陽明之長脈則爲陰病陽脈藏邪傳府故爲欲愈也

集註程知曰傷寒陰邪也故自利宜用四逆傷風陽邪也故煩

痛見於四肢凡太陰病脈浮者多是太陰中風

喻昌曰微瀉之中更察其脈之長而不短知元氣未瀉其病當自愈也

太陰病欲解時從亥至丑上

註

邪之解也必於所旺之時亥子丑乃太陰所旺之時也當此旺時故邪不能勝而自解矣

音切

趨

七句切

揭

音許

腐

音府

穢

於廢切

御製皇朝詩經

卷六

三







